

DESCRIPTION  
DES  
**PLANTES RARES**  
CULTIVÉES  
A MALMAISON ET A NAVARRE.

DESCRIPTION  
DES  
PLANTES RARES

CULTIVÉES  
A MALMAISON ET A NAVARRE.

PAR AIMÉ BONPLAND.



A PARIS,  
DE L'IMPRIMERIE DE P. DIDOT L'AINÉ.

1813.

# PÆONIA.

ORDO NATURALIS, PAPAVERACEÆ. JUSS.

POLYANDRIA DIGYNIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. JUSS. gen. plant. pag. 234. — GERTNER de fructib. et seminib.  
tom. I. p. 309. tab. 65.



## SPECIES.

### PÆONIA MOUTAN.

PÆONIA : caule suffruticoso, foliis biternatis, subtus glaucis, parce hirtellis; foliolis terminalibus, trifido-lobatis.

---

Habitat in Imperio Sinensi, ad Montem Ho-nan.

---

ARBUSTE formant buisson, haut de quatre pieds (12 décimètres), feuillu dès sa base.

TIGES : plusieurs, de la grosseur du doigt, droites, cylindriques, noueuses, recouvertes d'une écorce brune, presque lisse, entièrement dépourvues de feuilles; les pousses seules de l'année en sont garnies.

FEUILLES alternes, ouvertes, biternées, longues de douze à quinze pouces (4 décimètres), d'un vert foncé en dessus, glauques en dessous, parsemées de quelques poils très-courts; folioles terminales divisées jusque dans leur milieu en trois parties, rarement plus profondément; les folioles latérales de forme ovale sont inégalement divisées dans leur moitié supérieure, entières et inégales dans leur inférieure.

## PEONIA MOUTAN.

PÉTIOLLES glabres, embrassant à moitié les tiges; convexes en dehors, marqués intérieurement d'un léger sillon, et de couleur rose.

FLEURS rouges, solitaires, terminales.

CALICE composé de huit ou neuf folioles, dont les extérieures, plus longues et inégales tant dans leur forme que dans leur grandeur, sont réfléchies; les intérieures ovales, aiguës et droites, sont quelquefois marquées de rouge à leur sommet.

COROLLE composée d'un très-grand nombre de pétales fixés sur un disque charnu, légèrement élevé. La forme de chaque pétale est oblongue; ils sont rétrécis inférieurement d'un rouge plus ou moins foncé, évasés dans leur moitié supérieure, rarement entiers dans leur limbe, et d'un rose pâle, souvent d'un blanc nacré.

ÉTAMINES nombreuses, situées entre les ovaires et la corolle, longues de dix à quatorze lignes (3 centimètres); filets légèrement comprimés, rougeâtres, souvent blancs dans leur moitié supérieure; anthères droites, oblongues, s'ouvrant longitudinalement sur les côtés; poussière jaune.

PISTIL: ovaires six ou neuf, ovales, couverts d'un duvet tomenteux et blanchâtre; style nul; stigmate membraneux, plissé en dehors, d'un rouge très-vif.

FRUIT: cinq à neuf capsules longues d'un pouce (3 centimètres), couvertes de poils roussâtres, terminées par le stigmate qui persiste s'ouvrant longitudinalement en dedans, et renfermant cinq à sept ovules.

## OBSERVATIONS.

Le genre *Pæonia* a été très-anciennement connu. Pline, qui l'a établi, lui a donné le nom du médecin grec Pæon, qui, pendant le siège de Troie, guérit Mars blessé par Diomède, et qu'on suppose s'être servi pour cette cure de suc de pivoine.

La plupart des espèces connues de ce genre sont originaires du nord de l'Europe. Celle que je viens de décrire est indigène de la Chine, et diffère essen-



tiellement de toutes les autres pivoines, par ses tiges ligneuses. L'Afrique ni l'Amérique n'ont encore offert aux recherches des botanistes aucune espèce de ce genre.

C'est dans les montagnes de la province de Ho-nan que cette plante a été trouvée. On la cultive depuis plus de 1400 ans en Chine, sous le nom de *Moutan*, et c'est d'après les demandes répétées de Sir Joseph Banks qu'elle a été apportée à Londres en 1794. Malmaison possède cette superbe plante depuis 1803, et ce n'est que depuis deux ans qu'on la trouve dans quelques uns de nos jardins où elle a été répandue par les soins de M. Bourseau, qui a formé, en peu d'années, un établissement aussi intéressant par le nombre que par le choix des plantes qu'il y a rassemblées.

Cette nouvelle espèce de pivoine est généralement connue sous le nom de *Pivoine en arbre*. James Donn, à la page 134 de l'*Hortus Cantabrigiensis*, édition de 1809, lui a donné le nom de *Pæonia arborea*. Andrews, dans les planches 373, 448, et 463, du *Botanist Repository*, a figuré trois variétés de cette même plante, sous les noms de *suffruticosa* et de *papaveracea*. John Sims enfin, à la page 1154 du *Botanical Magazine*, l'a décrite sous le nom de *Pæonia Moutan*. J'ai adopté ce nom qui lui convient mieux que celui de *suffruticosa* ou d'*arborea*, parce que c'est celui sous lequel elle nous est parvenue, et qu'il est probable que des découvertes ultérieures nous feront connoître d'autres espèces ligneuses.

La beauté des fleurs du *moutan*, leurs formes variées, et l'odeur délicieuse qu'elles exhalent, l'ont fait rechercher des Chinois, chez qui elle est devenue l'objet d'une culture particulière. Elle fait sur-tout l'ornement des jardins des grands. Les cultivateurs donnent à cette plante mille formes diverses, et la multiplient par marcottes, par boutures, par les graines, et par le moyen de la greffe. Je n'entre ici dans aucun détail sur ce qui est dit de cette plante chez les Chinois, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et d'in vraisemblance dans ce qui en a été écrit.

On cultive à Malmaison deux variétés du *Pæonia Moutan*. Je donne à la planche première de cet ouvrage l'une de ses variétés, et l'autre sera figurée à la planche vingt-trois.

Les *moutans* passent l'hiver en pleine terre, mais ils demandent à être garantis du froid par des cages vitrées qu'il faut avoir soin de couvrir de paillasons pendant les nuits où le thermomètre descend à 0. Les *moutans* craignent aussi la grande humidité et un soleil trop ardent. Ces plantes, que nous cultivons en terre de bruyère, poussent chaque année des jets assez longs, mais leur majeure partie se flétrit, se dessèche, et meurt; d'où il résulte que l'accroissement annuel de cette plante ligneuse se réduit à deux ou trois pouces (7 centimètres). Nous n'avons encore vu multiplier les *moutans* que par les

---

\* Voyez les Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts et les mœurs des Chinois, par les missionnaires de Pékin, tom. III, pag. 461.

jeunes pousses qui partent des racines, et par les marcottes. L'un et l'autre moyen sont longs, et demandent les soins d'un jardinier habile. Le *moutan* le plus fort que nous ayons vu, a quatre pieds de hauteur (12 décimètres) et douze (3 mètres) de circonférence. Nous y avons compté, en mai 1812, treize fleurs, dont le parfum rappelle l'essence de rose. Quelque fort que soit cet individu, ses graines n'ont pas encore acquis le degré de maturité nécessaire à leur germination; mais l'observation semble indiquer qu'elles approchent chaque année de ce terme.

---

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE I.

*Une branche de Pæonia Moutan.*

# SIDA.

ORDO NATURALIS, MALVACEÆ. JUSS.

MONADELPHIA POLYANDRIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. Juss. gen. plant. p. 273. — GERTNER de fructib. et seminib.  
tom. II. p. 249. tab. 134.

## SPECIES.

### SIDA PULCHELLA.

SIDA: foliis oblongo-cordatis, acutis, crenatis; subtus pilis stellatis subtomentosis, supra  
pilosiusculis; racemis axillaribus, paucifloris, abbreviatis; capsulis biaristatis.

---

Habitat. . . . patria ignota.

---

ARBRISSEAU haut de quatre à six pieds (2 mètres); tronc droit, cylindrique, de la grosseur d'un doigt, recouvert d'une écorce presque lisse, brune, glabre.

RAMEAUX alternes, situés à des distances inégales, droits, feuillus; couverts d'une écorce verte, parsemée de poils étalés, disposés par faisceaux qui leur donnent un aspect blanchâtre.

FEUILLES alternes, rapprochées les unes des autres, étalées, longues de trois ou quatre pouces (1 décimètre); légèrement échancrées en cœur à la base, pointues au sommet, inégalement crenelées sur les bords, vertes en dessus et munies de poils courts, veinées en dessous, blanchâtres et légèrement tomenteuses par des faisceaux de poils, semblables à ceux qui couvrent les jeunes rameaux.

PÉTIOLÉS longs d'un pouce (3 centimètres), convexes en dehors, munis à leur base de deux stipules linéaires, et caduques.

FLEURS d'un blanc terne, disposées par petites grappes, situées dans les aisselles des feuilles.

CALICE en forme de cloche, divisé jusque dans son milieu en cinq parties égales et droites; garni extérieurement de poils simples.

COROLLE un peu plus grande que le calice, composée de cinq pétales oblongs, obtus, réunis par leur base, et formant corps avec le tube des étamines.

ÉTAMINES nombreuses, réunies en tube dans leur moitié inférieure; filets courts, en forme d'âlène; anthères réniformes; poussière blanche.

PISTIL; ovaire sphérique, déprimé et marqué de cinq stries longitudinales; styles cinq; stigmates en forme de tête.

FRUIT ovale, déprimé, composé de cinq petites capsules bivalves, à une seule loge, renfermant deux graines, et dont chaque valve est terminée par une petite pointe.

---

#### OBSERVATIONS.

La plante que je viens de décrire se cultive dans nos serres depuis plusieurs années. On l'a obtenue de graines, mais on ignore d'où ces graines ont été envoyées\*. Nos jardiniers pépiniéristes la désignent sous le nom de *Sida pulchella*, et j'ai cru devoir lui conserver ce nom, qui est déjà connu dans le commerce.

Le *Sida pulchella* est un joli arbrisseau, qui conserve ses feuilles toute l'année et ses fleurs pendant les mois de janvier, février, mars, et avril; il passe l'hiver dans l'orangerie ou dans la serre-chaude; cependant je me suis assuré

---

\* M. Noisette, l'un de nos pépiniéristes les plus distingués, et dont l'établissement mérite d'être visité par les étrangers, pense qu'elle est venue des graines apportées de la Nouvelle-Hollande par l'expédition du capitaine Baudin.

## SIDA PULCHELLA.

7

pendant l'hiver de 1811 et 1812 qu'une température de 15° est celle qui lui convient le mieux. Les fleurs, petites et d'un blanc terne, exhalent une odeur forte, semblable à celle des fleurs de nos châtaigniers; quelques unes sont dépourvues de styles, mais le plus grand nombre en est muni.

### EXPLICATION DE LA PLANCHE II.

*Fig. 1. Une fleur dont on a ôté la corolle pour montrer la forme et la position de l'ovaire. 2. Une corolle fendue selon sa longueur et étalée pour montrer la disposition des étamines. 3. Une fleur entière.*

# CACTUS.

ICOSANDRIA MONOGYNIA. LINN.

ORDO NATURALIS, CACTI. JUSS.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. JUSS. gener. pl. pag. 511. — GERTNER de fructib. et seminib.  
t. II. p. 265. tab. 138. fig. 3.

## SPECIES.

### CACTUS SPECIOSUS.

CACTUS : caulibus articulatis, compressis, foliaceis, serrato-repandis; floribus magnis, tubo  
inermi, squamuloso.

---

Habitat in America Meridionali ad Carthagenam.

---

RACINE de la grosseur du doigt, ligneuse intérieurement, produisant dès son collet plusieurs tiges qui ordinairement affectent une forme cylindrique, puis se dilatent et se compriment; quelquefois cependant, et dans un court espace, elles sont inférieurement triangulaires ou quadrangulaires, crénelées et pourvues dans les crénelures de faisceaux de poils mous et roussâtres.

TIGE rameuse, charnue, lisse, d'un vert tendre, composée de parties oblongues, comprimées, articulées, d'un pouce et demi (4 centimètres) de largeur sur trois ou six (8 à 16 centimètres) de longueur, marquées sur leurs bords de crénelures peu sensibles, et relevées dans toute leur longueur par une côte saillante.

## CACTUS SPECIOSUS.

9

FLEURS solitaires, sessiles, situées dans les crénélures des tiges; légèrement courbées, longues de quatre pouces (1 décimètre).

CALICE adhérent à l'ovaire, oblong, cylindrique, arqué, marqué dans sa longueur de sillons peu profonds, garni d'écaillés rougeâtres, ovales, réfléchies.

COROLLE d'un beau rouge, un peu plus longue que le calice auquel elle est attachée. Pétales nombreux, oblongs, comme disposés sur quatre rangs, et soudés ensemble à leur extrémité inférieure. Ceux qui forment les deux rangées extérieures sont étalés et plus courts; les plus intérieurs sont droits, et représentent une espèce de tube au centre duquel sont placés le style et les étamines.

ÉTAMINES droites, très-nombreuses, de même longueur que la corolle, soudées à son tube; filets blancs, très-grêles; anthères droites, jaunes, biloculaires, s'ouvrant longitudinalement sur les côtés.

PISTIL : ovaire oblong, situé au fond du calice auquel il adhère dans toutes ses parties; style filiforme; stigmates cinq ou sept rapprochés les uns des autres.

FRUIT. N'a pas encore été observé.

---

## OBSERVATIONS.

Le *Cactus speciosus* est originaire de l'Amérique méridionale. M. de Humboldt et moi l'avons trouvé, dans le mois d'avril 1801, près du petit village de Turbaco, situé à quelques lieues au sud de Carthagène, et élevé de 186 toises (360 mètres) au-dessus du niveau de la mer. Cette espèce, ainsi que plusieurs autres du même genre, croît sur le tronc des vieux arbres.

Le *Cactus speciosus* a beaucoup d'analogie, par le port, avec le *Cactus phyllanthus* et le *Cactus alatus*, avec lequel il avoit d'abord été confondu. Ce n'est que depuis le mois de mars 1811 où cette nouvelle espèce de cierge a donné des fleurs à Malmaison, qu'il m'a été possible d'établir les différences qui existent entre ces trois plantes.

Dans cette espèce les articulations sont en général moins larges et moins longues; les crénelures, plus rapprochées et prolongées supérieurement en forme de dents; les fleurs sont grandes, rouges, et très-remarquables par leur beauté: elles sont blanches, longues, et grêles dans le *Cactus phyllanthus*; petites et d'un vert blanchâtre dans le *Cactus alatus*. Il est probable que le *Cactus speciosus* est venu des graines que M. de Humboldt a envoyées en France.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE III.

FIG. I. Une fleur coupée selon sa longueur, et par moitié, pour montrer la position de l'ovaire, celle des pétales et des étamines.



# METROSYDEROS.

ORDO NATURALIS, MYRTI. *Juss.*

ICOSANDRIA MONOGYNIA. *Linn.*

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. GÆRTNER, de fructib. t. I. p. 170. tab. 34.

## SPECIES.

### METROSYDEROS SALIGNA.

METROSYDEROS. Foliis alternis, angustato-lanceolatis, utrinque acutis, setaceo-mucronatis, membranaceis, trinerviis; floribus rameis spicato approximatis.

---

Habitat in Nova Hollandia.

---

ARBRISSEAU toujours vert, haut de quinze pieds (5 mètres), très-feuillu, très-rameux; couvert d'une écorce grisâtre, légèrement gercée.

rameaux alternes, peu étalés, cylindriques inférieurement, anguleux à leur sommet, et garnis de quelques poils blanchâtres.

FEUILLES alternes, membraneuses, rapprochées, ouvertes, longues de trois pouces (8 centimètres), larges de sept ou neuf lignes (20 millimètres), plus aiguës au sommet qu'à la base, et terminées par une pointe aiguë; glabres, d'un vert luisant en dessus, et parsemées de petits points glanduleux; marquées en dessous de trois nervures, dont les latérales peu sensibles sont presque confondues avec les bords des feuilles. Les jeunes feuilles sont molles, d'un rouge plus ou moins foncé, et couvertes d'un duvet blanchâtre.

PÉTIOLÉS très-courts, convexes ou anguleux en dehors, unis intérieurement.

FLEURS en épi, d'un blanc pâle, situées à l'extrémité des jeunes rameaux et au dessous des jeunes feuilles, longues de six ou huit lignes (15 millimètres).

CALICE supérieur, glabre, persistant; tube ovale, vert, ponctué; limbe de cinq folioles arrondies, concaves intérieurement, scarieuses, roussâtres.

COROLLE composé de cinq pétales attachés au sommet du tube du calice, et alternes avec les divisions de son limbe; chaque pétale, moins long que le calice, a une forme arrondie, est concave intérieurement, et tombe peu de temps après le développement de la fleur.

ÉTAMINES droites, plus longues que la corolle, très-nombreuses, attachées au calice un peu au dessous de l'insertion des pétales; filets blancs, droits, distincts, deux ou trois fois plus longs que les calices.

ANTHÈRES droites, ovales, fixées par le milieu, s'ouvrant sur les côtes en deux loges; poussière jaune.

PISTIL : ovaire infère, situé et adhérent au fond du calice; style droit, de même longueur que les étamines, blanc dans sa moitié inférieure, vert supérieure; stigmate dilaté et tronqué.

FRUIT. Capsule renfermée dans le calice qui persiste, s'ouvrant par le sommet en trois valves, et composée de trois loges qui renferment un grand nombre de petites graines dont la forme varie beaucoup, mais qui sont en général plus minces du côté de leur insertion.

---

#### OBSERVATIONS.

Toutes les espèces de *Metrosyderos* connus jusqu'à ce jour sont originaires de la Nouvelle-Hollande, et la majeure partie de celles que nous cultivons viennent des graines apportées par l'expédition du capitaine Baudin. Ce genre a la plus grande affinité avec le genre *Melaleuca*, et n'en diffère véritablement

que par la disposition des étamines, qui sont distinctes dans les *Metrosyderos*, et réunies très-inégalement en cinq faisceaux dans les *Melaleuca*. De ce caractère peu sensible, il est résulté beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire qu'on a décrit comme *Metrosyderos* des espèces de *Melaleuca*, et vice versa.

Le célèbre Mutis, à la page 268 du Supplément de Linné, nous a donné le caractère du *Brathis*<sup>1</sup>. Ce genre n'a d'autres différences avec les *Hypericum*, que celle d'avoir les étamines réunies en faisceaux. Le *Brathis*, approuvé par Linné et par quelques autres botanistes, a été réuni aux *Hypericum* par plusieurs auteurs qui laissent subsister les genres *Metrosyderos* et *Melaleuca*. Une analyse exacte des espèces qui composent les quatre genres cités peut seule faire trouver des caractères qui serviront à établir des genres bien distincts, et qui éviteront la confusion des espèces.

Malmaison est très-riche en *Melaleuca* et en *Metrosyderos*; il y en a même plusieurs espèces non décrites, et qui n'ont pas encore fleuri: je me propose, dans cet ouvrage, de les figurer ainsi que toutes celles qui sont encore peu connues, et dont nous n'avons pas de figures coloriées bien exactes.

Les espèces décrites dans ces deux genres sont des arbrisseaux d'une forme agréable, conservant leurs feuilles pendant toute l'année. Ils produisent des fleurs de diverses couleurs, inodores et disposées d'une manière agréable. Ces plantes passent l'hiver dans l'orangerie, et sont susceptibles de rester en pleine terre dans nos provinces méridionales, ou dans quelque autre partie où la température moyenne de l'air s'élève jusqu'à 12° du thermomètre de Réaumur. Les feuilles des *Melaleuca* et des *Metrosyderos* sont ponctuées comme celles des orangers et de la plupart des myrtoïdes, et donnent une odeur aromatique très-agréable quand on les froisse.

Le *Metrosyderos saligna* dont je donne la figure à la planche IV, a été figuré en noir par M. Ventenat<sup>2</sup>: c'est un bel arbrisseau propre à l'ornement de nos serres et de nos jardins; il se couvre d'un grand nombre d'épis blancs pendant les mois de juillet et d'août. Ses fruits, comme ceux des autres espèces de ce genre, des *Melaleuca*, des *Leptospermus* et des *Eucalyptus*, ne sont mûrs et propres à la germination qu'après avoir resté deux ans sur l'arbre.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

Fig. 1. Une fleur entière. 2. Un calice avec le style. 3. Fleur coupée verticalement pour faire voir la position de l'ovaire, celle de la corolle et des étamines.

<sup>1</sup> *Brathis juniperina* sive *hypericum brathis*.

<sup>2</sup> Plantes cultivées dans le jardin de Cels, tab. 70. La figure donnée par M. Ventenat est en noir; elle a été faite sur un individu encore très-jeune, qui n'avoit pas acquis tout son développement, et sur lequel, il est probable, que les nervures des feuilles n'étoient pas encore développées; car elles ne paroissent pas dans la figure, et la description n'en fait pas mention.

# SILENE.

ORDO NATURALIS, CORYOPHYLLÆ.

DECANDRIA TRIGYNIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. Juss. gen. plant. p. 302.

## SPECIES.

### SILENE CHLORÆFOLIA.

SILENE glauca, calycibus glabris, clavatis, petalis semibifidis foliis, connatis, subrotundo ovalibus, inferioribus utrinque acutis, summis cordatis, sessilibus.

---

Habitat in Armenia.

---

PLANTE herbacée, glauque, vivace, haute de quinze à dix-huit pouces (5 décimètres); racines fibreuses, blanchâtres, fournissant dès leur collet plusieurs tiges droites, grêles, cylindriques, dichotomes, garnies de feuilles dès leur base, légèrement renflées aux articulations et souvent rougeâtres.

FEUILLES opposées, étalées, réunies à leur base, de huit ou dix lignes (2 centimètres) de diamètre; les inférieures, supportées par des pétioles très-courts, sont aiguës à la base et au sommet; les supérieures sessiles sont échancrées en forme de cœur à leur base.

FLEURS terminales, solitaires, portées sur de longs pédoncules.

---

\* Wild. sp. pl. t. II. p. 707.

## SILENE CHLORÆFOLIA.

15

CALICE oblong, membraneux, excavé inférieurement, ventru vers la partie moyenne, partagé au sommet en cinq dents ovales, droites et bordées d'une membrane scarieuse.

COROLLE : pétales cinq, supportés par un onglet de même longueur que le calice, ovales, inégalement dentés et très-ouverts. La gorge de la corolle est munie d'une couronne formée par dix petites dents qui se trouvent placées deux par deux au sommet des onglets des pétales.

ETAMINES dix un peu plus longues que le tube du calice; filets blancs, grêles; anthères ovales, poussière blanche.

PISTIL : ovaire-supère, terminé par trois styles plus longs que la corolle; stigmates divergens, marqués intérieurement de poils très-fins et très-courts.

FRUIT : capsule oblongue, renfermée dans le calice qui persiste, divisée inférieurement en trois loges, et s'ouvrant inégalement par le sommet.

---

## OBSERVATIONS.

Le *Silene chloræfolia* perd tous les ans ses tiges aux approches de l'hiver, et ses racines en produisent de nouvelles au printemps. On conserve en général cette plante dans l'orangerie; mais je pense qu'elle réussiroit en pleine terre, si on avoit la précaution de la couvrir de feuilles sèches.

Quoique cette espèce de *Silene* soit connue depuis long-temps, je n'ai pas hésité à la faire figurer, 1° parce qu'elle ne l'a pas encore été; 2° parce qu'elle est extrêmement rare; 3° enfin, parce qu'elle est d'un port et d'une couleur peu communs, et qu'elle contraste avec ces plantes d'une belle végétation qui avec elle servent à l'ornement de nos jardins.

Le nom de *Silene* a été tiré du mot grec *βίβαλον*, *bave*, parce que plusieurs espèces sont couvertes d'un suc gluant. Les espèces connues de ce genre sont très-nombreuses et pour la plupart originaires d'Europe.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE V.

Un rameau du *Silene chloræfolia*.

# GOODENIA.

ORDO NATURALIS, GOODENOVIE. *BROWN.*

LOBELLIACEÆ. *JUSS.*

PENTANDRIA MONOGYNIA. *LINN.*

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. *BROWN*, Prodr. floræ novæ Holland. p. 574.

## SPECIES.

### GOODENIA GRANDIFLORA.

*GOODENIA* herbacea, glanduloso-pubescent; pedunculis axillaribus, unifloris; ramis striato-angulatis; foliis cordatis, dentato-serratis, plerumque lyratis.

---

Habitat in nova Hollandia.

---

PLANTE annuelle, haute de deux à trois pieds (8 décimètres), parsemée de poils courts, portant chacun au sommet une glande d'où découle une humeur visqueuse.

TIGES plusieurs, droites, peu rameuses et marquées longitudinalement de stries inégales.

FEUILLES alternes, membraneuses, échancrées inférieurement en forme de cœur, aiguës au sommet, dentées sur les bords, molles et supportées par de longs pétioles, ordinairement munis sur les côtés de deux ou quatre folioles opposées, dont la forme est celle d'un ovale, mais dont la grandeur varie beaucoup.

BRACTÉES deux, ovales, très-petites et persistantes, situées à la base de chaque pétiole.

## GOODENIA GRANDIFLORA.

17

FLEURS irrégulières, jaunes, parsemées de taches rougeâtres, supportées par de longs pédoncules, situées dans les aisselles des feuilles.

PÉDONCULE axillaire, uniflore, long d'un pouce et demi (4 centimètres), strié longitudinalement, muni à sa partie inférieure de deux très-petites bractées opposées, le plus souvent simple et portant une seule fleur, rarement divisé en deux et portant alors deux fleurs.

CALICE supère, oblong, persistant, tube pentagone, limbe divisé en cinq parties égales, dont les deux supérieures sont plus écartées entre elles que les autres.

COROLLE bilabée, attachée au calice, composée de trois pétales, dont deux, arrondis et supportés par de longs onglets, forment la lèvre supérieure; le troisième, étroit inférieurement, plus large au sommet et divisé en trois parties, forme la lèvre inférieure.

ÉTAMINES, cinq plus courtes que la corolle. Filets blancs; anthères droites, linéaires, s'ouvrant longitudinalement sur les côtés.

PISTIL. Ovaire infère, terminé par un style droit, rouge, charnu, garni de poils et plus long que la corolle; stigmaté en forme de cloche, réfléchi, rouge en dedans, garni de poils sur les bords.

FRUIT. Capsule oblongue, couronnée par les divisions du calice qui persistent, composée de deux loges, de deux valves, d'une cloison parallèle aux valves, et de plusieurs graines.

---

### OBSERVATIONS.

Le genre *Goodenia* a été établi par Smith<sup>1</sup> en l'honneur du docteur Samuël Goodenough, naturaliste anglais. La plupart des espèces qui composent ce genre sont originaires de la Nouvelle-Hollande; nous en connoissons très-peu avant la publication du savant ouvrage de Robert Brown, qui en a décrit 32 espèces<sup>2</sup>, et qui a pris ce genre pour type d'un nouvel ordre naturel auquel il a donné le nom de *Goodenoviées*.

---

<sup>1</sup> Mémoires de la soc. Linn. vol. II.

<sup>2</sup> Prodrum. floræ Nov. Holland. et insulæ Van-Diemen, page 574.

Depuis la publication de l'ouvrage de Robert Brown, M. de Jussieu a fait paroître, dans le 18<sup>e</sup> volume des Annales du Muséum, un mémoire sur deux nouvelles familles de plantes qu'il désigne sous le nom de *Lobeliacées* et de *Stylidiées*. Ce travail, médité depuis long-temps et enrichi des savantes observations de M. Richard, est très-précieux. Il a pour but de donner des caractères plus exacts à la famille des *Stylidiées*, et de comprendre dans une même famille, sous le nom de *Lobeliacées*, les *Lobelia* et toutes les autres plantes à corolle monopétale et fendue, qui auparavant étoient rapportées aux campanulacées.

Comme MM. de Jussieu et Richard, je pense que le genre *Lobelia* doit être compris dans la même famille que le *Goodenia* et autres genres placés par Robert Brown dans les *Goodenoviées*, et qu'il seroit plus convenable de donner le nom de *Lobeliacées* à cette nouvelle famille, parce que les *Goodenia*, presque tous originaires de la Nouvelle-Hollande, sont assez rares, tandis que les *Lobelia*, pour la plupart originaires d'Europe et d'Amérique, sont plus nombreux, plus anciennement connus, et généralement plus répandus.

Le *Goodenia grandiflora* dont je donne la figure à la planche VI, est annuel, et ne se trouve dans aucun ouvrage publié en France. Sims, à la planche 890 du Botanical Magazin, en a donné une figure; et Jacquin, dans ses Fragmenta Botanica, planche 92 et page 62, a décrit, sous le nom de *Goodenia appendiculata*, une plante qui me paroît être la même que le *Goodenia grandiflora*. La différence extrême qui existe entre les feuilles de la plante publiée par Jacquin et les feuilles de celle que je viens de décrire, peut avoir été causée par la qualité du terrain et le mode de culture. Le *Goodenia appendiculata* ne seroit donc qu'une variété, et non une espèce distincte.

Le *Goodenia grandiflora* est la plus belle des espèces de ce genre, et mérite d'être cultivée avec soin.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE VI.

*Un rameau du Goodenia grandiflora.*



# LOBELIA.

ORDO NATURALIS, LOBELIACEÆ. *JUSS.* <sup>1</sup>

PENTANDRIA MONOGYNIA. *LINN.*

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. *Juss. gen. plant.* pag. 165. — *SCHÆB. gen. pl. t. II. p. 596.*

## SPECIES.

### LOBELIA FULGENS.

*LOBELIA erecta, pubescens: foliis longo-lanceolatis, inæqualiter dentatis: corollæ laciniis duabus superioribus longo-linearibus; tribus inferioribus maximis, reflexis, ovalibus, mucronatis.*

---

Habitat in pratis Imperii Mexicani, juxta Valladolid.

---

PLANTE vivace, garnie, sur toutes ses parties, de poils blancs, droits, plus ou moins nombreux.

RACINE fibreuse, produisant un grand nombre de drageons.

TIGES simples ou rameuses, hautes de trois à quatre pieds (1 mètre), droites, feuillues, marquées dans les deux tiers inférieurs de crénelures longitudinales; presque lisses dans le tiers supérieur, et souvent d'un violet foncé.

FEUILLES éparses, longues de trois à cinq pouces (1 décimètre), lancéolées, peu ouvertes, semi-amplexicaules, inégalement dentées sur les bords, veinées en-dessus, et couvertes sur les deux faces de poils courts.

---

<sup>1</sup> *Annal. du Muséum d'hist. nat. tom. 18, pag. 1 et suiv.*

FLEURS d'un rouge très-vif, longues d'un pouce (environ 3 centimètres), disposées en grappe à l'extrémité des tiges.

PÉDONCULES simples, plus courts que le calice, ne portant jamais qu'une seule fleur, et munis à leur base d'une foliole ou bractée plus courte que la fleur.

CALICE presque supère, persistant, profondément divisé en cinq parties linéaires, droites.

COROLLE irrégulière, bilabée, fendue longitudinalement en-dehors; la lèvre supérieure droite, divisée en deux parties plus courtes et plus étroites que celles de la lèvre inférieure: lèvre inférieure réfléchie, divisée en trois parties oblongues, obtuses, terminées par une pointe aiguë.

ÉTAMINES, cinq attachées à la base du tube de la corolle: filets membraneux, réunis par leurs bords et formant un tube cylindrique plus étroit au sommet qu'à la base: anthères réunies par leurs bords, formant un tube cylindrique un peu arqué vers le sommet. De ces anthères, les trois supérieures sont plus longues et garnies de poils distincts vers le haut; les deux inférieures, plus courtes, portent au sommet un faisceau de poils droits et très-serrés.

STIGMATE: ovaire presque entièrement infère, sphérique; style légèrement arqué, de même longueur que les étamines; stigmate bilamellé, garni à sa base d'un anneau de poils très-serrés, qui enveloppe les divisions du stigmate avant leur écartement, et qui tombe ensuite.

FRUIT: capsule ovale, déprimée, biloculaire; enveloppée par le calice qui persiste; elle s'ouvre au sommet en deux valves séparées longitudinalement par une cloison à la base de laquelle est fixé le réceptacle.

GRAINES nombreuses, très-petites.

---

#### OBSERVATIONS.

Le genre *Lobelia* est très-anciennement connu; il a été établi en l'honneur

de Lobel, botaniste flamand. Les espèces de ce genre sont vivaces ou annuelles. On en trouve dans tous les climats et dans tous les pays.

En général, ces plantes fournissent un suc plus ou moins laiteux, et passent pour être vénéneuses. A la Havane, où le *Lobelia longiflora*, que nous cultivons ici dans nos serres, se trouve très-abondamment sur les bords des ruisseaux, on le nomme *Preventa-Cavalo*, parce que les chevaux qui en mangent enflent presque subitement, et meurent. Dans le royaume de Quito, sur les bords du Rio Mayo, on en trouve une nouvelle espèce, dont le suc très-laiteux s'épaissit par le contact de l'air, et donne de la gomme élastique que les naturels emploient à faire des balles dont ils se servent pour jouer. Parmi les nombreuses espèces que M. de Humboldt et moi avons trouvées dans le cours de notre voyage, nous n'en connaissons aucune autre qui offre des propriétés sensibles.

Le *Lobelia fulgens* dont je donne la figure à la planche VII de cet ouvrage, est originaire du Mexique, d'où nous l'avons apporté en 1804. Cette espèce, la plus belle de tout le genre, croît spontanément dans les plaines élevées de l'Intendance de Valladolid, à 800 et 1000 toises de hauteur au-dessus du niveau de la mer. Plus tard je donnerai la figure et la description du *Lobelia splendens*, et j'établirai les différences qui existent entre ces deux plantes, dues au voyage de M. de Humboldt, et déjà publiées par le professeur Willdenow, à qui nous les avons communiquées \*.

On cultive à Malmaison plusieurs espèces de *Lobelia*, qui toutes se multiplient de graines, de boutures, ou par les éclats des pieds. Les *Lobelia fulgens*, *splendens*, *cardinalis* et *siphylitica* sont de pleine terre, et méritent d'être cultivés avec soin, par le bel effet qu'ils produisent dans les massifs; le *Lobelia fulgens* sur-tout est remarquable par ses épis de fleurs très-nombreux et d'un rouge éblouissant. Le *Lobelia triquetra*, qui est d'orangerie, mérite aussi d'être multiplié: c'est une jolie espèce qui conserve ses fleurs pendant presque toute l'année. Parmi ceux qu'on cultive dans les serres, le *Lobelia surinamensis* est le seul qui mérite de fixer l'attention par la beauté de ses fleurs.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE VII.

FIG. 1. Une fleur entière pour montrer la disposition et la forme des divisions de la corolle. 2. Idem dont on a ôté la corolle pour faire voir la disposition des étamines et la différence de forme des anthers. 3. Un pistil indiquant l'adhérence de l'ovaire avec le calice et l'anneau de poil qui se trouve au sommet du stigmate.

\* Wild. hort. Berol. tab. 85 et 86.

# MELALEUCA.

ORDO NATURALIS, MYRTI. JUSS.

POLYADELPHIA ICOSANDRIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. Juss. gen. plant. p. 323. — GERTNER de fructib. t. 1. p. 172.  
tab. 35. fig. 1.

## SPECIES.

### MELALEUCA CHLORANTHA.

MELALEUCA foliis sparsis, creberrimis, oblongo-ovalibus, obtusiusculis, (junioribus subtrigatis, ciliatis); floribus infra ramulos spicatum conjectis; ramulis glabris.

---

Habitat in Nova Hollandia.

---

ARBRISSEAU toujours vert, haut de huit à dix pieds (3 mètres), très-rameux; tronc droit cylindrique de deux pouces (8 centimètres) de diamètre, couvert d'une écorce grisâtre qui se lève par plaques inégales.

RAMEAUX épars, peu étalés, nus inférieurement, couverts d'une écorce luisante, sur laquelle on remarque quelques vestiges des tubercules qui supportent les feuilles; les jeunes rameaux et ceux de deux ou trois ans sont plus grêles, feuillus, et offrent, selon toute leur longueur, des tubercules alongés au sommet desquels les feuilles sont attachées.

FEUILLES éparses, très-nombreuses, très-rapprochées, ouvertes, presque coriaces, longues de six à huit lignes (15 millimètres) sur deux

MELALEUCA CHLORANTHA.

25

de largeur, d'un vert foncé, et ponctuées. Les jeunes feuilles sont ciliées et ordinairement marquées en-dessous de trois nervures peu sensibles.

PÉTIOLLES très-courts, appliqués le long des rameaux, droits, aplatis intérieurement, convexes en-dehors.

FLEURS d'un vert jaunâtre, formant un épi ovale au-dessous du sommet des jeunes rameaux.

CALICE ovale, semi-supère, glabre, persistant; d'un vert foncé en-dehors, ponctué, partagé en cinq dents égales, caduques, bordées d'une membrane mince et transparente.

COROLLE: cinq pétales d'un vert clair jaunâtre, attachés un peu au-dessous des dents du calice avec lesquels ils alternent; ils sont de forme ovale, de même longueur que le calice, concaves, ponctués et scarieux sur les bords.

ÉTAMINES: vingt-cinq à trente, d'un vert jaunâtre, beaucoup plus longues que le calice auquel elles sont attachées; filets cylindriques, distribués en cinq faisceaux par une membrane courte et entière; anthères ovales d'un jaune pâle, fixés par le milieu, s'ouvrant du côté opposé en deux loges; poussière verdâtre.

PISTIL: ovaire semi-infère; style droit de même longueur et de même couleur que les étamines; stigmate urcéolé.

FRUIT: capsule sphérique, enveloppée par le calice devenu très-épais, composée de trois valves qui s'ouvrent par le sommet, et divisée intérieurement en trois loges.

GRAINES très-nombreuses, cunéiformes, ponctuées, attachées sur un réceptacle qui se trouve placé au fond de chaque loge et à la base d'un axe central.

---

OBSERVATIONS.

Cette nouvelle espèce de *Melaleuca* est originaire de la Nouvelle-Hollande, d'où les graines nous ont été apportées par l'expédition du capitaine Baudin.

Andrews, à la planche DCLXXVI du Botanist's Repository, a donné une figure de cette même plante sous le nom de *Melaleuca diosmaefolia*. J'aurais conservé ce nom s'il se trouvoit déjà publié dans d'autres ouvrages, quoiqu'il n'offre pas une indication bien précise de l'espèce; il me semble plus convenable de l'appeler *Chlorantha*, des mots χλωρός, jaune, et άνθος, fleur; ce nom indique un caractère plus précis. Il est important de distinguer le *Melaleuca chlorantha* du *Melaleuca viridiflora*, avec lequel il pourroit être confondu, mais dont il diffère essentiellement par la forme de ses feuilles.

Le *Melaleuca chlorantha* a fleuri pour la première fois en France en 1809, dans les jardins de Malmaison. C'est un très-joli arbrisseau qui se cultive dans l'orangerie, et qui est très-propre à l'ornement des serres et des jardins. Ses fleurs, d'un vert jaunâtre et disposées en épi, commencent à se développer à la fin d'avril, et se succèdent pendant les mois de mai, de juin et une partie de juillet; il en transsude une liqueur sucrée, aromatique, et tellement abondante que la culture de cet arbrisseau ajouteroit aux richesses économiques du midi de l'empire, en offrant une nouvelle ressource pour la nourriture des abeilles.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII.

FIG. 1. Une fleur entière. 2. Idem dont on a enlevé les pétales, et deux faisceaux d'étamines pour montrer l'insertion et la disposition des étamines. 3. Un rameau portant des fruits. 4. Un fruit séparé. 5. Une valve vue de son côté intérieur. 6. Graines de grosseur naturelle. 7. Graine grossie.

## PÆONIA DAURICA.

PÆONIA : caule herbaceo, foliis biternatis, subtus albidis, pubescentibus ; foliolis terminalibus, trifidolobatis ; petiolis interne pilosis. Floribus dignis ; capsulis tomentosis.

---

Habitat in Siberia.

---

PLANTE vivace, haute d'un pied (3 décimètres) ; du collet de la racine s'élèvent plusieurs tiges de la grosseur d'une plume à écrire, pourvues à leur base de bractées dont les supérieures, plus grandes, sont concaves, de forme ovale, et inégalement fendues à leur sommet ; à deux ou quatre pouces (8 centimètres) d'élévation, elles commencent à se subdiviser et à porter des feuilles.

FEUILLES alternes, droites, longues de six à sept pouces (18 centimètres), biternées, vertes en-dessus, blanchâtres en-dessous, garnies de poils courts, droits, et très-nombreux ; les folioles terminales sont en général divisées jusqu'à leur milieu en trois lobes et quelquefois plus profondément ; les latérales sont rarement entières, inégalement bilobées ou trilobées.

PÉTIOLLES creusés intérieurement d'un sillon profond, garni sur les bords de poils courts, nombreux et très-distincts.

FLEURS simples, d'un rouge cramoisi, terminales, solitaires ou géminées, portées sur un pédoncule court.

CALICE composé de six ou sept folioles inégales, dont quatre ou cinq intérieures, orbiculaires, concaves en-dedans, diaphanes sur les bords ; les autres, beaucoup plus longues, sont plus larges au sommet qu'à la base, et quelquefois divisées.

COROLLE composée de cinq ou huit pétales, insérée à la partie extérieure d'un disque charnu qui entoure les ovaires à la manière d'un anneau ; pétales orbiculaires d'inégale grandeur.

ÉTAMINES nombreuses, fixées à la partie intérieure du disque, et sépa-

rées les unes des autres par de petits mamelons rougeâtres, partagés en deux par un sillon; filets courts, rouges dans leur moitié inférieure, blancs dans la supérieure; anthères droites, oblongues, se tournant en spirale lors de la maturité du pollen, s'ouvrant longitudinalement sur les côtés; poussière jaune.

PISTIL: ovaire, un ou deux ovales, couverts d'un duvet tomenteux, blanchâtre; style nul; stigmate membraneux, allongé, aplati, arqué, de couleur rouge foncée.

FRUIT: capsule ovale, blanche, tomenteuse, surmontée par le stigmate qui persiste, marquée en-dedans d'une suture longitudinale par où elle s'ouvre en deux valves; rouge en-dedans, et garnie de poils.

GRAINES ovales de couleur rose, très-nombreuses, attachées au bord des valves, rangées sur une seule ligne.

---

#### OBSERVATIONS.

Le *Pæonia Daurica* <sup>1</sup> est originaire de Sibérie, d'où il a été envoyé en Angleterre par John Bell en 1790. On cultive cette nouvelle plante à Malmaison depuis 1810 seulement, et elle y a fleuri tous les ans dans le mois de mai.

Le *Pæonia Daurica* porte trois ou quatre tiges herbacées, hautes d'un pied (3 décimètres), et terminées ordinairement par deux fleurs; il est garni de feuilles droites et rapprochées qui lui donnent l'apparence d'un petit buisson. Les fleurs simples, d'un rouge cramoisi, offrent un aspect agréable.

Cette Pivoine, comme toutes les autres espèces du même genre, est propre à l'ornement de nos jardins; elle demande à être cultivée dans la terre de bruyère, et garantie du froid pendant l'hiver. Les fruits qu'elle porte cette année font espérer qu'on pourra la multiplier de graines et la répandre dans les autres jardins de France où elle est encore inconnue.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE IX.

Pla. 1. Un fruit entier, de grosseur naturelle. 2. Capsule ouverte. 3. Une graine entière. 4. Idem coupée selon sa longueur, et indiquant la position et la grandeur de l'embryon.

---

<sup>1</sup> Andrewss. Botanist Repertory, tom. VII, tab. 486.



# ERICA.

ORDO NATURALIS, ERICÆ. *JUSS.*

OCTANDRIA MONOGYNIA. *LINN.*

## CHARACTER GENERICUS.

**HABITUS:** frutrices procumbentes, adscendentes, erecti, ramosi. Folia minuta, sparsa, alterna, plerumque verticillata, petiolis brevissimis cauli appressis, suffulta. Flores admodum diversiformes, axillares aut terminales, varie dispositi.

**FLORESCENTIA:** calyx tetraphyllus, inferus, persistens, quandoque coloratus uni vel multi-bracteatus, ebracteatusve; foliolis figura diversissimis.

**COROLLA** hypogyna, constanter quadrifida, nunc campanulata, nunc urceolata, seu varie tubulosa.

**STAMINA** octo, ad ambitum disci hypogyni inserta, inclusa, aut exserta: filamenta superne introrsum arcuata; antheræ approximatae aut etiam conniventes, biloculares; loculis partim prorsusve distinctis, postice aristatis, seu cristatis muticisve.

**PISTILLUM:** ovarium superum, sessile aut stipitatum; stylus unicus staminibus longior; stygma recussum; subquadrigibbum.

**PERICARPIMUM.** Capsula depresso-globosa, calyce persistente tecta, longitudinaliter sulcata, quadrilocularis, quadrivalvis, polysperma, valvis medio septiferis, ad axim centralem mediante septo partim affixis. Semina minutissima.

*SPECIES.***ERICA** GRANDIFLORA.

ERICA : ramis ramulisque virgatis, foliis senis, quaternisve, longo-linearibus, patenti-reflexis : floribus axillaribus, cylindraceo-tubulosis, subarenatis, infra ramulorum apicem spicato-aggregatis : filamentis apice bifidis ; antheris exsertis, loculis muticis sejunctis.

---

Habitat ad Caput Bonæ Spei.

---

PLANTE ligneuse, s'élevant à trois ou quatre pieds (1 mètre) de haut ; tige de la grosseur du petit doigt, couverte d'une écorce grise, marquée de cicatrices provenant de la chute des feuilles.

RAMEAUX verticillés, droits, rapprochés les uns des autres, feuillus.

FEUILLES disposées en verticille de quatre ou de six, longues de trois quarts de pouce (20 millimètres), linéaires, ouvertes ou réflexes, convexes en-dessus, et portées par un pétiole court.

FLEURS en tube d'un beau jaune, disposées une à une dans les aisselles des feuilles, pédicellées et comme rassemblées en épi.

PÉDICELLE court, muni à sa partie moyenne de deux bractées opposées.

CALICE : quatre folioles ovales, larges inférieurement, diaphanes sur les bords, marquées en-dehors d'un sillon longitudinal, aiguës au sommet.

COROLLE, en forme de tube, plus longue que les feuilles, légèrement arquée, partagée en quatre divisions ovales, obtuses, un peu réflexes.

ÉTAMINES, huit, plus longues que la corolle, attachées autour d'un disque hypogyne, légèrement charnu ; filets droits, jaunâtres dans leurs deux tiers inférieurs, amincis, arqués en-dedans, rouges et

## ERICA GRANDIFLORA.

29

bifurqués au sommet; anthères jaunes, formées de deux loges portées chacune sur un pédicelle particulier.

PISTIL: ovaire sphérique, attaché sur un disque hypogyne; style droit, plus long et de même couleur que les étamines; stigmate brun, légèrement charnu, et comme divisé en quatre parties.

FRUIT. Non observé.

## OBSERVATIONS.

Les Bruyères forment un genre très-nombreux. Les Anglois les aiment beaucoup, et les cultivent avec autant de soin que de succès. James Donn, dans son *Hortus Cantabrigiensis*, édition de 1811, en indique trois cent quatorze espèces qui se trouvent presque toutes gravées dans le bel ouvrage d'Andrews. La plus belle et la plus riche collection de ce genre que je connoisse en France, est à Navarre; elle se compose de cent trente-deux espèces bien déterminées, dont la plupart ont des fleurs en tube. Des semis considérables, faits en 1811, 1812 et 1813, ont produit un grand nombre d'autres espèces non déterminées, et qui le seront à mesure qu'elles fleuriront.

Je compte dans le cours de cet ouvrage donner toutes les Bruyères qui ont des fleurs en tube, comme étant les plus belles et les plus propres à l'ornement de nos serres et de nos jardins. En parlant de chacune d'elles, j'indiquerai son pays natal, le mode de culture qu'elle exige, et la manière de la multiplier.

L'*Erica Grandiflora*, dont je donne la figure à la planche X, est originaire du Cap de Bonne-Espérance, d'où elle a été apportée en 1775. Comme la plupart des autres espèces de ce genre, on la cultive dans une serre tempérée, le plus près du vitrage possible. Cette Bruyère est remarquable par ses rameaux droits, garnis de feuilles longues, linéaires et étalées; par ses fleurs en tube, d'un jaune foncé, glabres, penchées, et souvent teintées d'un rouge brun. On la cultive à Malmaison et à Navarre, où elle fleurit tous les ans. Le meilleur moyen de multiplier cette plante, qui ne nous a pas encore donné de graines, c'est d'en faire des marcottes: les boutures réussissent difficilement.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE X.

FIG. 1. Une portion de rameau pour montrer le nombre et la disposition des feuilles. 2. Corolle fendue selon sa longueur et étalée pour faire voir la forme et la direction des divisions. 3. Une fleur dont on a ôté la corolle pour faire voir la disposition et la direction des étamines. 4. Une étamine grossie. 5. Pistil grossi.

# GOMPHOLOBIUM.

ORDO NATURALIS, LEGUMINOSÆ. *Juss.*

DECANDRIA MONOGYNIA. *LINN.*

*CHARACTER GENERICUS.*

Vid. *SMITH* in *Linn. societ. transact.* vol. IV. p. 220.

*SPECIES.*

## GOMPHOLOBIUM FURCELLATUM.

*GOMPHOLOBIUM*; aphyllum, canescens, ramulis setaceo-furcellatis; spicis paucifloris; calyce reflexo.

---

Habitat in Nova Hollandia.

---

PLANTE ligneuse, haute de trois à quatre pieds (1 mètre), couverte de poils blancs soyeux qui lui donnent un aspect argenté; divisée dès sa base en un grand nombre de rameaux.

rameaux épars, grêles, droits inférieurement, penchés vers le sommet, inégalement anguleux, produisant selon toute leur longueur de petits ramillets qui sont deux à deux, se divisent en trois, et dont les divisions latérales se subdivisent, tandis que l'intermédiaire est simple. Ces ramillets et leurs divisions sont pourvus à la base d'une petite stipule ovale, aiguë.

FLEURS, de couleur jaune mêlée de rouge, éparses ou comme rassemblées en épi vers le sommet des rameaux.

CALICE infère, persistant, velu au-dehors, divisé en cinq parties oblongues, aiguës, réfléchies.

# GOMPHOLOBIUM FURCELLATUM.

31

COROLLE papillonacée, attachée au calice, et composée de cinq pétales; étendard arrondi, échancré au sommet, terminé inférieurement par un onglet court et marqué à sa base d'une tache semi-lunaire d'un rouge foncé; ailes, deux plus courtes que l'étendard et la carène; carène de couleur rouge, formée de deux pétales distincts, plus longs que l'étendard.

ETAMINES, dix penchées sur le côté : filets distincts inégaux, arqués vers leur sommet, de couleur rose : anthères ovales fixées par le milieu, biloculaires; poussière jaune.

PISTIL. Ovaire supporté par un pédicule court : style arqué; stigmate vert, obtus.

FRUIT. Capsule velue, ovale, comprimée, renfermant deux ou trois graines réniformes.

## OBSERVATIONS.

Le genre *Gompholobium* a été établi par Smith, qui en a donné la description dans les Transactions de la société linnéenne de Londres<sup>1</sup>. La nouvelle espèce de ce genre que je viens de décrire est originaire de la Nouvelle-Hollande, d'où les graines ont été apportées par l'expédition du capitaine Baudin. Je n'ai encore vu cette plante que dans les jardins de Malmaison, où il en existe un seul pied.

Nous connoissons à peine dix espèces de ce genre. Toutes demandent à être cultivées en serre tempérée, sont difficiles à multiplier, donnent rarement des fruits mûrs, et périssent dans un instant. Elles exigent les soins d'un jardinier habile et très-assidu. Le *Gompholobium Furcellatum* présente au premier aspect beaucoup d'analogie avec le *Gompholobium Spinosum*<sup>2</sup>; mais il en diffère essentiellement en ce qu'il est dépourvu d'épines et que toutes ses parties sont couvertes de poils.

Ce nom de genre est formé des mots γόμφος, cheville, et λοβός, capsule; à cause de la ressemblance qu'on a trouvée de son fruit avec une cheville.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XI.

Fig. 1. Les cinq pétales détachés pour faire voir leur forme et leur grandeur respective. 2. Le pistil. 3. Une fleur dont on a ôté la corolle pour faire voir la disposition des étamines et celle des divisions du calice. 4. Un ovaire grossi, et dont on a enlevé un des côtés de l'enveloppe pour montrer la disposition des graines. 5. Un ramillet détaché, indiquant ses divisions.

<sup>1</sup> Vol. IV, pag. 220.

<sup>2</sup> Labill. Novæ Holland. speci. t. I, p. 107, tab. 136.

# CORREA.

ORDO NATURALIS, RUTACEÆ. JUSS.

OCTANDRIA MONOGYNIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. SMITH, act. soc. Linn. vol. IV. VENTENAT jard. de Malm. p. 13.

## SPECIES.

### CORREA VIRIDIFLORA.

CORREA : foliis cordato-oblongis, stellatim hirsutis reflexis, subtus ferrugineis, subsessilibus :  
floribus solitarie terminalibus, cernuis.

---

Habitat in Nova Hollandia.

---

PLANTE ligneuse, haute de deux à trois pieds (1 mètre), rameuse dès sa base, et couverte sur presque toutes ses parties de glandes sphériques portant au sommet un faisceau de poils qui lui donnent l'aspect tomenteux.

RAMEAUX opposés, peu étalés, cylindriques, rarement glabres dans leur partie inférieure seulement.

FEUILLES opposées, presque sessiles, ovales, lanccolées, membraneuses, ouvertes ou réfléchies, longues d'un à un pouce et demi (5 centimètres), vertes en dessus, convexes et parsemées de glandes portant un faisceau de poils, concaves en dessous, tomenteuses, blanchâtres, obtuses au sommet, élargies à la base, et échancrées en cœur.

PÉTIOLÉS très-courts.

FLÉURS en tube, de couleur verdâtre, disposées une à une, presque sessiles et réfléchies à l'extrémité des jeunes rameaux.

CALICE infère, campanulé, persistant, tronqué à son limbe, et divisé en quatre petites dents droites.

COROLLE tubulée, longue d'un pouce (3 centimètres), tomenteuse, formée de quatre pétales étroitement unis par leurs bords, séparés au sommet, droits.

ÉTAMINES : huit, exsertes, ainsi que la corolle, fixées sur un disque hypogyne : filets droits, verdâtres, dont quatre plus longs alternent avec les quatre autres plus petits : anthères ovales, droites, biloculaires : poussière jaune.

PISTIL : ovaires, quatre peu distincts, fixés sur un disque hypogyne, surmontés chacun d'un faisceau de poils : un seul style, situé au centre des quatre ovaires : stigmate simple.

FRUIT : quatre capsules ovales, dispermes, entourées dans leur moitié inférieure par le calice qui persiste, tomenteuses, comprimées et terminées par un faisceau de poils, longs et inégaux.

GRAINES semblables à celles d'un petit haricot.

---

#### OBSERVATIONS.

Le genre *Correa* a été établi par Smith, en l'honneur de M. Correa de Serra, botaniste très-distingué, auquel nous devons d'excellents mémoires sur la carpologie<sup>1</sup>. Ce genre appartient à la famille des *Rutacées*; c'est le même que celui qui a été publié par M. Labillardière sous le nom de *Mazeutoxéron*, dans sa Relation du voyage à la recherche de la Peyrouse.

Nous cultivons deux espèces de *Correa*; la première, figurée à la planche XIII de la Flore de Malmaison par M. Ventenat, est le *Correa alba*; la seconde est le *viridiflora*, dont je donne la figure à la planche XII de cet ouvrage. Cette dernière espèce, couverte sur toutes ses parties de faisceaux de poils disposés en étoile, diffère essentiellement de la première par la forme

---

<sup>1</sup> Mémoires de la société Linnéenne de Londres, vol. V et VI. Annales du Muséum d'hist. nat.

de ses feuilles, par celle de ses fleurs, et me semble avoir beaucoup d'analogie avec le *Correa reflexa* \*. Les espèces connues jusqu'à ce jour sont originaires de la Nouvelle-Hollande. Elles passent l'hiver dans l'orangerie, et se multiplient facilement de boutures.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XII.

FIG. 1. Fleur entière. 2. Un calice avec le pistil. 3. Une corolle étalée pour montrer son rapport avec les étamines et sa forme. 4. Pistil. 5. Id. grossi pour faire voir le disque sur lequel il repose et les poils qui couvrent le sommet des ovaires. 6. Ovaires grossis et coupés transversalement pour montrer leur nombre. 7. Fruit mûr. 8. Une loge ou une coque ouverte indiquant les deux graines qu'elle renferme. 9. Une graine séparée.

---

\* *Mazutoxeron rufum* de Labill., Atlas pour servir à la recherche de La Peyrouse, tab. 19.



# EUCALYPTUS.

ORDO NATURALIS, MYRTI. JUSS.

ICOSANDRIA MONOGYNIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. l'HERIT. sert. angl.

## SPECIES.

### EUCALYPTUS DIVERSIFOLIA.

EUCALYPTUS: foliis glaucis, falcato-lanceolatis, apice mucronatis, ad basin aequaliter angustatis: umbellis axillaribus: operculo conico mutico: capsula turbinata, operculo cruciformi clausa.

---

Habitat in Nova Hollandia.

---

ARBRE toujours vert, de vingt pieds (7 mètres) de hauteur; tronc droit, cylindrique, de quatre à cinq pouces (12 centimètres) de diamètre, recouvert d'une écorce grisâtre presque lisse.

RAMEAUX alternes, ouverts, un peu tortueux, cylindriques.

FEUILLES alternes, glauques, persistantes, de forme et de longueur différentes, longues de deux à quatre pouces (15 à 16 centimètres) sur cinq à huit lignes (10 à 18 millimètres) de largeur; droites ou courbées en faucille, légèrement coriaces, ponctuées, comme charnues et rougeâtres sur les bords, aiguës à la base, terminées au sommet par une pointe molle plus ou moins alongée. Dans les jeunes pieds, les feuilles inférieures sont opposées, sessiles, ovales, lancéolées, ou oblongues.

PÉTIOLÉS longs de six lignes (12 millimètres), rougeâtres, garnis de petits tubercules, sillonnés en-dedans, convexes en-dehors.

FLEURS d'un blanc pur, disposées en ombelle, et situées dans les aisselles des feuilles.

PÉDICELLE droit, beaucoup plus court que les feuilles, portant ordinairement six ou neuf fleurs presque sessiles.

CALICE supère, demi-sphérique, persistant, fermé par une coiffe en forme de cône, qui tombe lors du développement des étamines.

COROLLE: il n'y en a pas.

ÉTAMINES nombreuses, insérées au bord intérieur du calice: filets blancs, droits, plus longs que le calice: anthères biloculaires, ovales, fixées par le milieu: poussière jaune.

PISTIL: ovaire infère: style droit plus court que les étamines: stigmate aigu.

FRUIT: capsule turbinée, entièrement recouverte par le calice devenu très-épais: fermée par un opercule en forme de croix, composé de quatre ou huit pièces fortement unies ensemble: divisée jusque vers son milieu en quatre valves, et intérieurement en quatre loges.

GRAINES nombreuses, très-dures, de formes différentes, attachées à un réceptacle commun placé au centre de la capsule.

#### OBSERVATIONS.

Le genre *Eucalyptus* <sup>1</sup> a été établi par l'Héritier, et le caractère générique donné par cet auteur a été adopté par tous les botanistes. L'examen que j'ai fait de l'*Eucalyptus diversifolia*, qui est la seule espèce que j'aie vue en fleur, me porte à croire que le caractère de ce genre doit être réformé. Il faut espérer que M. Robert Brown, qui a vu un grand nombre d'espèces vivantes, fera ce travail dans le second volume de son *Flora Novæ Hollandiæ*, que tous les botanistes attendent avec impatience.

Nous connoissons à peu près vingt-quatre espèces d'*Eucalyptus*, décrites dans les divers auteurs; mais il en existe un bien plus grand nombre, soit dans

<sup>1</sup> Formé de Εὖ bon, bien, et de καλύπτω, je couvre, je ferme; parce que le calice des espèces de ce genre, avant le développement des étamines, est entièrement recouvert par une coiffe.

nos jardins, soit dans nos herbiers. L'herbier seul du Muséum en possède plus de quinze espèces nouvelles.

L'*Eucalyptus diversifolia* est dû à l'expédition du capitaine Bandin, qui en a apporté les graines de la Nouvelle-Hollande. Il est curieux d'observer que les naturalistes qui composoient cette expédition n'ont pas apporté cette plante dans leurs herbiers, et que la majeure partie des espèces de ce genre que nous cultivons, sont nouvelles, et ne se trouvent même pas dans les herbiers.

Ce qui me porte à croire que le caractère générique des *Eucalyptus* doit être réformé, c'est que sur celui que je viens de décrire, la capsule est fermée par un opercule cruciforme, composé de quatre ou huit pièces étroitement soudées. Cet opercule tombe à l'époque de la maturité des graines, et indique le temps précis de leur récolte. Il est probable que cette partie dont aucun botaniste n'a parlé, existe dans plusieurs autres espèces du même genre.

Les feuilles dans les jeunes plants de cet *Eucalyptus*, de même que dans plusieurs autres espèces du même genre qui se cultivent à Malmaison, sont opposées, et affectent une forme entièrement différente de celle des mêmes individus plus avancés dans leur végétation.

Les *Eucalyptus* offrent une nouvelle richesse au midi de l'Empire. M. Martin, savant estimable, directeur du jardin botanique de Toulon, a mis depuis plusieurs années, en pleine terre, un petit pied d'*Eucalyptus* qu'il avoit reçu de Malmaison. Cette plante, que j'ai vue dans l'été de 1813, avoit acquis plus de vingt pieds de hauteur, et étoit, pour la première fois, couverte de fruits bien nourris. Cette seule expérience prouve que les *Eucalyptus* peuvent croître avec l'olivier, les grenadiers, les citronniers, et d'autres arbres utiles de nos provinces méridionales.

L'*Eucalyptus* cultivé par M. Martin nous paroît être le même que l'*Eucalyptus diversifolia*. Les petites différences que j'observe entre l'échantillon de cette plante, que j'ai cueilli à Toulon, et les pieds que je cultive à Malmaison, semblent être produites par le changement de culture ou par le climat.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XIII.

Fig. 1. Une fleur avant son développement. 2. Une fleur ouverte. 3. Coiffe d'une fleur. 4. Fleur dont on a enlevé la moitié pour faire voir la position de l'ovaire et des étamines. 5. Une étamine. 6. Un bouquet de fruits. 7. Une capsule vue par dessus. 8. Opercule qui ferme la capsule. 9. Une graine.

# EUPATORIUM.

ORDO NATURALIS, CORYMBIFERÆ. *Juss.*

SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS. *Lin.*

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. *Juss. gen. pl. pag. 178. Schreb. gen. pl. tom. II. p. 546.*

## SPECIES.

### EUPATORIUM DELTOIDEUM.

*EUPATORIUM*: foliis petiolatis hastato-triangularibus, trinerviis; subequaliter crenatis, subtus pubescentibus; panicula corymbosa; calycibus multifloris.

---

Habitat: patria ignota.

---

PLANTE vivace, haute de quatre à six pieds (près de 2 mètres), garnie de feuilles dès sa base, peu rameuse.

TIGES: plusieurs, droites, de la grosseur du petit doigt, cylindriques et glabres inférieurement.

FEUILLES opposées, membraneuses, ouvertes, longues de quatre à cinq pouces (12 centimètres), triangulaires, hastées, glabres en-dessus, crénelées sur les bords, marquées en-dessous de trois nervures saillantes, et garnies de poils courts.

PÉTIOLLES longs d'un pouce et demi ou deux pouces (5 centimètres), aplatis intérieurement, convexes en-dehors, et couverts de poils très-courts.

## EUPATORIUM DELTOIDEUM.

59

PANICULE TERMINALE, composée de plusieurs faisceaux de fleurs, portés sur un pédoncule commun.

FLEURS blanches, composées de quarante fleurons hermaphrodites, ou à peu près, supportées chacune par un pédicule pourvu à son sommet d'une ou de plusieurs bractées linéaires.

CALICE commun, en forme de cloche, composé de quarante folioles linéaires, droites, presque égales.

FLEURONS nombreux (quarante), cylindriques, divisés au sommet en cinq dents ovales, souvent de couleur rose.

ETAMINES: cinq, insérées à la base de la corolle: anthères ovales, incluses, réunies par leurs bords en un cylindre.

PISTIL: ovaire infère, linéaire, marqué de stries longitudinales: style filiforme, divisé jusque vers son milieu: stigmates divergens, de couleur rose.

FRUIT: graine linéaire, longue de trois à quatre lignes (8 millimètres), marquée de stries longitudinales, et parsemée de poils roides: couronnée par une aigrette composée de dix rayons ou à peu près, garnis de poils sur les bords.

RÉCEPTACLE: glabre, légèrement convexe.

---

### OBSERVATIONS.

Je donne la figure de l'*Eupatorium deltoideum*, parce que j'en ai trouvé le dessin dans la belle collection des vélins de Malmaison; cette plante est déjà gravée à la planche 369 de l'*Hortus Schanbrunensis*; elle est très-rare et peu connue: je ne l'ai vue qu'à Vienne et à Malmaison.

Cette Eupatoire est probablement originaire de l'Amérique méridionale; elle est de serre chaude, et on peut l'avoir en fleur pendant la plus grande partie de l'année. C'est une très-belle plante, qui, par son feuillage et ses panicules de fleurs, mérite d'être recherchée pour l'ornement de nos serres pendant les mois d'hiver.

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XIV.

FIG. 1. Une fleur vue par-devant, et très-avancée. 2. Un calice ouvert. 4. Une graine couronnée de son aigrette.

# BOEHMERIA.

ORDO NATURALIS, URTICÆ. JUSS.

MONOECIA TETRANDRIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. SCHREB. gen. p. tom. II. p. 632. Sw. prod. 34.

## SPECIES.

### BOEHMERIA CAUDATA.

BOEHMERIA: caule suffruticoso; foliis oppositis subcordato ovalibus, trinerviis, acuminatis, serratis; spicis longissimis, pendulis.

---

Habitat in Antillis.

---

PLANTE ligneuse, haute de quatre à cinq pieds (15 décimètres), produisant, dès le collet de sa racine, plusieurs tiges droites, glabres et cylindriques inférieurement; feuillues et pubescentes vers leur sommet.

FEUILLES opposées, ouvertes, réfléchies; longues de quatre ou six pouces (15 centimètres), ovales, membraneuses; légèrement échan-crées à leur base, acuminées au sommet, également dentées sur les bords, marquées en-dessous de trois nervures saillantes, et parse-mées sur l'une et l'autre face de poils courts.

PÉTIOLÉS longs de un à deux pouces (3 à 5 centimètres), pubescens, légèrement sillonnés en-dedans, convexes en-dehors.

ÉPIS pendans, très-longs, disposés un à un dans les aisselles des

BOEHMERIA CAUDATA.

41

feuilles, et composés de fleurs mâles ou de fleurs femelles seulement, ou quelquefois de fleurs mâles mêlées avec des fleurs femelles.

FLEURS MALES, disposées sur un épi très-long, rapprochées les unes des autres.

CALICE : composé de quatre folioles ovales et marquées en-dehors de trois nervures saillantes.

COROLLE : il n'y en a pas.

ETAMINES : quatre, plus longues que le calice, et fixées autour d'un corps charnu qui occupe le centre de la fleur : filets droits : anthères ovales, droites, s'ouvrant longitudinalement sur les côtés.

FLEURS FEMELLES, disposées par petits groupes sur un épi très-long, et munies d'une bractée.

BRACTÉE : plus longue que l'ovaire, lancéolée, terminée par une pointe alongée, pubescente.

CALICE et COROLLE : il n'y en a pas.

PISTIL : ovaire, très-petit, terminé par un style droit : stigmat aigu.

GRAINES ovales, comprimées, pubescentes, terminées par le style qui persiste, et marquées sur les côtés par les bords saillans devenus comme charnus.

---

OBSERVATIONS.

Le *Bœhmeria caudata* publié dans l'Encyclopédie \* par M. de Lamarck, a été décrit sur un échantillon apporté de l'île de France par Sonnerat et l'*Urtica fruticosa*, dont parle Brown dans son Histoire de la Jamaïque †, est regardée par tous les auteurs comme la même plante. Il est certain que la courte description que donne Brown de sa plante convient parfaitement à celle de Sonnerat, mais il est impossible avec une simple description de distinguer la plante rapportée de l'Inde de celle dont parle l'auteur anglois.

---

\* Dict. pag. 640.

† Page 338, n° 11.

## BOEHMERIA CAUDATA.

Pour éclaircir le doute de quelques botanistes, j'ai cru devoir donner la figure exacte du *Boehmeria caudata* publié par M. de Lamarck, et je l'ai fait d'autant plus volontiers, que les caractères de ce genre ne se trouvent pas figurés dans l'excellent ouvrage de Gærtner.

Le *Boehmeria caudata* est une très-belle plante; elle doit être cultivée en serre chaude, dont elle fait l'ornement par la beauté de son feuillage pendant les derniers mois d'hiver.

Ce genre a été établi par Jacquin en l'honneur de George Rodolphe Boehmer, professeur de botanique et d'anatomie à l'académie de Wittenberg, mort en 1803.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XV.

FIG. 1. Une fleur mâle. 2. Une foliole du calice. 3. Les étamines annexées au corps charnu situé au centre de la fleur. 4. Un groupe de jeunes fruits vu par derrière pour faire voir la manière dont ils sont attachés à l'api et la position de la bractée. 5. Id. vu par devant. 6. Bractée isolée pour en faire voir la forme. 7. Un fruit détaché. 8. Id. coupé verticalement pour faire voir la situation de la graine.



## ERICA EDELINIA.

ERICA : ramis ramulisque erectis; foliis quaternis linearibus, patentibus; floribus cernuis, infra ramulorum apicem verticillatis, spicato-aggregatis; corollis tubulosis, clavatis, basi excavationibus quatuor notatis; staminibus inclusis, aristis setaceis instructis; stylo exserto.

---

Habitat ad Caput Bonæ Spei.

---

PLANTE ligneuse, s'élevant à quatre ou cinq pieds (15 décimètres) de haut, glabre sur toutes ses parties.

FEUILLES disposées en verticilles de quatre, linéaires, ouvertes, rapprochées, longues de trois ou cinq lignes (10 millimètres), convexes et glabres en-dessus, blanchâtres en-dessous et marquées d'un léger sillon.

FLEURS en tube d'un rouge de corail pâle, longuement pédicellées, penchées, disposées en verticilles et tellement rapprochées qu'elles représentent un épi plus ou moins long.

PÉDICELLE arqué, long de quatre lignes (9 millimètres), cylindrique, pourvu vers sa base de deux petites bractées ovales et opposées.

CALICE formé de quatre folioles ovales, recourbées sur les bords, diaphanes, ou moins colorées, vertes au centre, marquées en-dessous d'un léger sillon.

COROLLE, en forme de tube, inégalement cylindrique, et légèrement arquée; marquée à sa base de quatre dépressions ou excavations; rétrécie vers le sommet, divisée à son limbe en quatre parties obtuses et droites.

ÉTAMINES: huit, plus courtes que la corolle, attachées autour d'un disque hypogyne: filets blancs, grêles, droits; anthères, jaunes formées de deux loges réunies seulement à leur base, et munies en dehors de deux appendices ou arêtes setiformes.

PISTIL : ovaire supère, posé sur un disque hypogyne, marqué de quatre côtes peu saillantes, glabre et d'un vert clair: style droit, blanc, plus long que la corolle: stigmat brun en forme de tête.

FRUIT : non observé.

## OBSERVATIONS.

L'*Erica* que je viens de décrire se trouve dans la collection des plantes de Navarre et dans celle de M. Cels, où elle est désignée depuis très-long-temps sous le nom d'*Erica mammosa coccinea*. Les recherches exactes que j'ai faites de cette plante dans le bel ouvrage d'Andrews; dans la dernière édition de l'*Hortus Cantabrigiensis* par Donn, et dans les catalogues de MM. Lee et Kennedy, que j'ai reçus tout récemment, ayant été infructueuses, j'ai examiné cette plante avec le plus grand soin, et j'ai acquis la certitude qu'on devoit la considérer comme une espèce nouvelle, et non comme une variété de l'*Erica mammosa*.

J'ai donné à cette nouvelle bruyère le nom d'*Erica edelinia*, en l'honneur d'Edeline, jardinier en chef de Navarre, qui cultive les bruyères avec un succès étonnant, ainsi que les autres plantes qui lui sont confiées.

L'*Erica edelinia* diffère de l'*Erica mammosa* et de ses variétés par le port et la disposition de ses rameaux; par la forme, la dimension et la couleur de ses fleurs; par les appendices des anthères; par l'ovaire, et enfin par le style, qui est plus long que la corolle. Cette nouvelle bruyère semble avoir quelque analogie avec l'*Erica verticillata*; mais la couleur de ses fleurs et la forme de ses appendices doivent la faire regarder comme une espèce différente. L'*Erica edelinia* est probablement originaire du Cap de Bonne Espérance. Elle se propage difficilement par les boutures; mais on l'obtient facilement de marcotte; elle se couvre de beaux épis de fleurs d'un rouge de corail pâle pendant les derniers jours d'août, le mois de septembre, d'octobre, et les premiers jours de novembre.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XVI.

FIG. 1. Une fleur entière. 2. Corolle fendue selon sa longueur et étalée pour faire voir la disposition et la forme des quatre enfoncements. 3. Une étamine. 4. Une foliole du calice vue par derrière. 5. Le pistil. 6. Une portion de rameau pour indiquer la manière dont les feuilles sont verticillées quatre à quatre.

# LINUM.

ORDO NATURALIS, CARYOPHILLÆ. JUSS.

PENTANDRIA PENTAGYNIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. Juss. gen. pl. pag. 303. GÆRTN. de Fruct. t. II, p. 146, tab. 112, fig. 11.

## SPECIES.

### LINUM TRIGYNUM.

LINUM: caule suffruticoso, foliis alternis, ovali-oblongis, subintegerrimis, mucronatis; floribus trigynis, calyce quinquepartito, lacinii lanceolatis.

---

Habitat in India Orientali.

---

PLANTE ligneuse, haute de deux à trois pieds (1 mètre), glabre, rameuse, revêtue d'une écorce verte très-lisse.

RAMEAUX alternes, droits, inégalement cylindriques, feuillus.

FEUILLES alternes, pétiolées, ovales ou oblongues, ouvertes, d'un à un pouce et demi (3 centimètres) de largeur, sur trois (8 centimètres) de longueur, généralement entières, très-rarement denticulées, munies au sommet d'une pointe molle; d'un vert luisant en-dessus; glauques en-dessous, et marquées de veines peu saillantes.

PÉTIOLÉS longs de six à dix lignes (2 centimètres), convexes en-dessus et en-dessous, bordés sur les côtés d'une crête légèrement saillante.

11

FLEURS jaunes, en forme de cloche, disposées une à une dans les aisselles des feuilles, supportées par un pédoncule plus court que le calice, qui est muni à sa base de petites bractées.

CALICE infère, persistant, oblong, profondément divisé en cinq parties lancéolées, légèrement inégales, concaves intérieurement, et terminées par une pointe aiguë.

COROLLE en forme de cloche très-ouverte, attachée au tube des étamines, composée de cinq pétales adhérens par leurs parties moyennes; chacun de ses pétales est long d'un pouce et demi (4 centimètres), large au sommet et arrondi; inférieurement il est terminé par un onglet charnu.

ÉTAMINES: dix, plus courtes que les pistils, réunies inférieurement en un seul corps par un tube membraneux très-court. Des filets, cinq sont constamment plus courts et dépourvus d'anthères; les cinq autres, plus longs, sont subulés et portent une anthère droite, jaune, composée de deux loges qui s'ouvrent en-dehors.

PISTIL: ovaire supère; trois styles droits, de même longueur que le tube de la corolle, terminés par un stigmate sphérique, verdâtre et comme partagé en deux dans leur longueur par un léger sillon.

FRUIT: capsule sphérique, déprimée, garnie à sa base des cinq divisions du calice qui persistent; composée de six valves ou coques s'ouvrant longitudinalement en-dedans et renfermant une seule graine.

GRAINE ovale, aplatie sur les côtés, fixée à l'angle supérieure et interne de chaque valve.

---

#### OBSERVATIONS.

Cette nouvelle espèce de lin est originaire des Indes Orientales, d'où elle a été apportée en Angleterre en 1802. Les premiers pieds que nous avons eus de cette plante en France ont été envoyés de Londres à Malmaison vers la fin de 1810.

Le *Linum trigynum* est ligneux ; il se présente sous la forme d'un petit buisson ovale, garni de feuilles dès sa base ; il est vert presque toute l'année, et commence à porter des fleurs en décembre. Ce lin passe l'hiver dans l'orangerie, dont il contribue à faire l'ornement par la multitude de ses fleurs, qui sont grandes, d'un jaune vif et brillant. Parmi les espèces connues de ce genre, c'est la seule qui n'ait que trois styles, et on doit regretter que sa corolle tombe vingt-quatre heures après son développement.

Sowerby, à la planche XVII de l'Exotic Botany, a donné la figure de cette nouvelle espèce de lin, et l'a représentée avec des feuilles dentées. Je cultive à Malmaison un très-grand nombre d'individus de cette plante, qu'on multiplie facilement par boutures ; et sur tous les pieds que j'ai examinés, je n'ai vu que des feuilles entières, ou légèrement crénelées sur les bords quand elles sont très-avancées dans leur végétation.

Le *Linum trigynum* doit venir en pleine terre dans le midi de l'Europe et porter des graines qui serviront à le répandre promptement dans tous nos jardins.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XVII.

FIG. 1. Une fleur dont les pétales sont tombés. 2. Etamines réunies à leur base en un seul corps par une membrane. 3. Ovaire terminé par trois styles. 4. Une capsule munie du calice qui persiste. 5. Idem dont les loges commencent à se séparer. 6. Une des valves qui forment la capsule. 7. Une graine.

# LINARIA.

ORDO NATURALIS, SCHROPHULARIÆ. JUSS.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. DESFONT. Flora atl. t. II, p. 37.

## SPECIES.

### LINARIA PAUCIFLORA.

LINARIA : caule simplici ; foliis linearibus, glaucis, inferioribus quaternis ; floribus breviter pedicellatis ; calcare arcuato, corolla triplo longiore.

---

Habitat : patria ignota.

---

PLANTE annuelle, glauque : divisée, dès le collet de sa racine, en plusieurs tiges, dont les plus faibles sont couchées et les plus fortes droites.

FEUILLES linéaires, ouvertes, disposées en verticille de quatre à la base des tiges, solitaires et alternes vers le sommet.

EPI TERMINAL, composé de cinq ou huit fleurs plus ou moins rapprochées, beaucoup plus longues que les pédicelles.

CALICE : divisé jusqu'à la base en cinq parties ovales, garnies de quelques poils sur les bords.

COROLLE : labiée, de couleur violette, blanche à sa gorge et marquée

## LINARIA PAUCIFLORA.

49

de taches d'un violet foncé, longue d'un pouce, terminée à sa base par un éperon très-long, recourbé et aigu; lèvre supérieure droite, divisée en deux parties tellement rapprochées qu'elles semblent ne former qu'un seul corps; lèvre inférieure réfléchie, divisée en trois parties ovales, obtuses: renflée intérieurement à sa base, et formant par ce renflement la gorge de la corolle.

ÉTAMINES, quatre, dont deux plus petites: filets légèrement arqués, courts: anthères ovales.

PISTIL: ovaire supère, terminé par un style court: stigmaté légèrement charnu.

FRUIT: capsule ovale, entourée à sa base par le calice, qui persiste, percée au sommet de deux trous; formée par quatre valves et divisée intérieurement en deux loges renfermant un grand nombre de graines.

---

## OBSERVATIONS.

Les genres *Linaria*, *Anarrhinum*, et *Antirrhinum* ont beaucoup d'analogie; cependant ils doivent être considérés comme trois genres bien distincts d'après les caractères donnés par M. Desfontaines, dans son *Flora Atlantica*.<sup>1</sup>

Cette division, fondée sur des caractères constants, rend l'étude des espèces qui composent ces trois genres beaucoup plus facile. Presque toutes ces plantes sont originaires d'Afrique et d'Europe. La plupart sont annuelles; quelques unes sont vivaces; il y en a peu de ligneuses.

La nouvelle espèce de *Linaria* dont j'ai donné la figure à la planche XVIII, est cultivée à Malmaison depuis 1810: cette espèce, dont j'ignore la patrie et à laquelle j'ai donné le nom de *Linaria pauciflora*, a beaucoup d'analogie avec le *Linaria laxiflora* de M. Desfontaines<sup>2</sup>; mais elle en diffère cependant par ses tiges, beaucoup plus longues; par ses feuilles, plus éloignées les unes des autres; par ses fleurs, plus grandes et supportées par des pédicules plus courts; par l'éperon recourbé, plus long et plus aigu; elle en diffère enfin par la lèvre supérieure, dont les divisions sont tellement rapprochées, qu'elles semblent n'en former qu'une seule.

---

<sup>1</sup> Vol. II, pag. 37 et suiv.

<sup>2</sup> *Flora Atlantica*, tom. II, pag. 45, tab. 138.

## LINARIA PAUCIFLORA.

Cette Linaire a aussi quelque analogie, par son port et sa couleur, avec le *Linaria glaucophylla*<sup>1</sup>; mais elle en diffère essentiellement par la disposition et la grandeur des feuilles ainsi que par celle des fleurs.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XVIII.

FIG. 1. Un calice vu de côté. 2. Une fleur idem dépourvue de son calice.

---

<sup>1</sup> Flore Portugaise, publiée par Link et Offmansegg. tab. 6.



# ACACIA.

ORDO NATURALIS, LEGUMINOSÆ. JUSS.

POLYGAMIA MONOCÆCIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. WILLD. Spec. plant., tom. IV, p. 1049.

## SPECIES.

### ACACIA LINIFOLIA.

ACACIA: foliis angustato-linearibus, strictis, mucronatis; spicis globosis, pedunculatis, racemosis; racemis, solitariis folia subæquantibus.

---

Habitat in Nova Hollandia.

---

PLANTE ligneuse, glabre, haute de six à huit pieds (2 à 3 mètres), divisée plus ou moins bas en rameaux grêles; recouverte d'une écorce grisâtre.

RAMEAUX alternes, recourbés vers leur extrémité, feuillus, couverts d'une écorce grisâtre, marquée de petits carènes ou tubercules formés par le soulèvement de l'écorce au-dessous de l'insertion des feuilles.

FEUILLES alternes, très-rapprochées les unes des autres, longues d'environ un pouce et demi (4 centimètres), linéaires, légèrement plus étroites vers leur base, plus larges au sommet, arrondies et terminées par une pointe molle.

PÉTIOLÉS très-courts, renflés extérieurement à leur base, et comme articulés.

STIPULES : deux, très-petites, opposées, à la base de chaque pétiole, caduques.

FLEURS, de couleur jaune, disposées dans une panicule axillaire, solitaire, de même longueur à-peu-près que les feuilles, et formée de capitules sphériques, pédicellés.

CALICE très-petit, en forme de cloche évasée, partagé à son limbe en cinq divisions plus ou moins régulières.

COROLLE trois fois plus grande que le calice, formée de cinq pétales réunis par leurs bords dans leur moitié inférieure, ouverts et aigus au sommet.

ÉTAMINES nombreuses; filets grêles, aigus à leur sommet, libres dans toute leur longueur; anthères ovales, à deux loges.

PISTIL : ovaire ovale, glabre, terminé par un style droit de même longueur que les étamines; stigmat subulé.

FRUIT non observé.

#### OBSERVATIONS.

Le professeur Willdenow a divisé, avec raison, le genre *Mimosa* en plusieurs autres, et a pris pour base de ce nouveau travail les parties de la fructification. Lorsqu'on connoitra mieux les fruits des Mimoses, il sera nécessaire, je pense, pour rendre le travail de Willdenow plus parfait, d'établir encore quelques nouveaux genres, et l'on pourra en même temps rapporter d'une manière plus exacte les espèces à chacun des genres auxquels elles appartiennent.

L'*Acacia linifolia*, dont je donne la figure à la planche XIX, a déjà été figuré par Andrews<sup>1</sup> et par Ventenat<sup>2</sup>. Je me suis cependant déterminé à faire graver cette plante, 1<sup>o</sup> parcequ'elle devient très-rare dans les collections; 2<sup>o</sup> parcequ'elle varie beaucoup dans les diverses époques de sa végétation, ce qui fait confondre ses variétés sous plusieurs noms; 3<sup>o</sup> enfin parcequ'elle fait partie de la précieuse collection des vélins de Malmaison. Dans la suite de cet ouvrage, je donnerai les figures de quelques *Acacia* nouveaux, à feuilles simples; je ferai en même temps l'énumération de toutes les espèces connues de cette section, et j'assignerai à chacune le caractère qui lui convient.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XIX.

FIG. 1. Une fleur entière et grossie, vue par derrière. 2. Un pétale détaché, pour en montrer la forme. 3. Une étamine. 4. Un pistil.

<sup>1</sup> Botanist repos. tab. 394.

<sup>2</sup> Descript. des pl. nouv. du jardin de Cels, tab. 2.

# MAGNOLIA.

ORDO NATURALIS, MAGNOLIÆ. JUSS.

POLYANDRIA POLYGYNIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. Juss. gen. pl. p. 281... GERT. de fruct. et sem. tom. I, p. 343, tab. 70.

## SPECIES.

### MAGNOLIA YULAN.

MAGNOLIA : foliis ob-ovalibus abrupte acuminatis, subtus petiolisque pubescentibus,  
membranaceis, deciduis.

---

PLANTE ligneuse, haute de six à douze pieds (2 à 4 mètres), divisée, à quelque distance du collet de sa racine, en branches alternes, recouverte d'une écorce de couleur brune, et presque lisse.

RAMEAUX alternes, cylindriques, éloignés les uns des autres, ouverts, glabres inférieurement, et parsemés de petits tubercules de couleur grisâtre; garnis de poils à leur sommet.

FEUILLES alternes, membraneuses, longues de quatre ou six pouces (1 décimètre) sur quatre pouces (6 centimètres) de largeur; plus larges au sommet qu'à la base, et terminées par une pointe aiguë; glabres en-dessus, et garnies de poils en-dessous, notamment sur les nervures.

PÉTIOLÉS longs d'un pouce (2 centimètres), pubescens, cylindriques dans leur moitié supérieure, creusés en gouttière dans l'inférieure, et renflés.

STIPULES ovales, caduques, glabres en-dedans; couvertes en-dehors de poils soyeux, gris, luisans, très-serrés et très-nombreux.

FLEURS d'un blanc de lis, terminales, solitaires, très-grandes, d'une odeur douce et très-agréable, s'épanouissant avant le développement des feuilles.

CALICE : il n'y en a pas.

COROLLE composée de neuf pétales charnus, disposés sur trois rangées, longs de trois à quatre pouces (1 décimètre) sur un pouce ou deux (4 centimètres) de largeur, droits dans leur moitié inférieure, ouverts et creusés en forme de cuiller dans leur moitié supérieure.

ETAMINES nombreuses, attachées entre les ovaires et la corolle; filets charnus, très-courts; anthères linéaires, composées de deux loges, fixées au filet dans toute leur longueur, et terminées par le prolongement de ce même filet : poussière jaune.

PISTIL : ovaires nombreux, placés sur un réceptacle commun en forme de cône, et terminés chacun par un style court et subulé.

FRUIT : non observé.

#### OBSERVATIONS.

Le genre *Magnolia*, dédié par Linné à Pierre Magnol, célèbre botaniste français, qui vivoit dans le 17<sup>e</sup> siècle, comprend à peu près douze ou quinze espèces, qui sont originaires de l'Amérique septentrionale, de la Chine ou du Japon. L'Europe, l'Afrique et le vaste continent de l'Amérique espagnole n'ont pas encore offert aux botanistes une seule espèce de ce genre.

Tous les *Magnolia* connus se cultivent en pleine terre ou dans l'orangerie, sous le climat de Paris, et pourroient tous être cultivés en pleine terre, moyennant une exposition favorable, ou un abri assez fort pour empêcher la gelée. Le midi de la France et l'Italie offrent de grands avantages pour la culture en pleine terre de toutes les espèces de ce genre. Depuis long-temps on récolte des graines du *Magnolia grandiflora* à Montpellier, à Toulouse, à Milan, à Venise, et dans plusieurs autres parties méridionales de l'Europe. Les *Magnolia glauca* et *umbrella*, cultivés en pleine terre dans notre climat, fructifient, et donnent de très-bonnes graines.

Le *Magnolia yulan*, dont je donne la figure à la planche XX, est originaire de la Chine; c'est la même plante que celle qui est indiquée sous le nom de *Magnolia conspicua*, à la page 339 du troisième volume de l'*Hortus Kewensis*<sup>1</sup>.

Cette plante est très-recherchée par les Chinois, qui la cultivent avec beaucoup de soin pour l'ornement des jardins et des palais de leurs souverains. Depuis 1806, on cultive à Malmaison le *Magnolia yulan*. Cet établissement a long-temps possédé seul cette plante; mais depuis trois ans on commence à la répandre dans nos divers jardins. En 1811, j'ai fait mettre en pleine terre plusieurs pieds du *Magnolia yulan*: depuis ce temps, ils ont acquis un grand accroissement, et chaque année ils se couvrent de fleurs vers la fin du mois de mars et les premiers jours d'avril. Ces arbrisseaux, qui ont aujourd'hui douze pieds, ont résisté aux froids rigoureux de 1813 et de 1814, quoiqu'ils ne fussent couverts que d'une cage vitrée couverte de paillassons. Le *Magnolia yulan* mérite l'attention des cultivateurs et des amateurs de plantes, pour la beauté de ses fleurs, qui sont d'un blanc de lis, pour l'odeur délicieuse qu'elles exhalent, et pour la magnificence de son feuillage, qui ne se développe qu'après la floraison.

Je ne pense pas qu'on puisse obtenir de fruits mûrs de ce *Magnolia* dans notre climat; mais j'espère que dans peu d'années on en aura à Milan, dans les jardins de Montza, où j'ai envoyé un très-beau pied de cette plante, il y a déjà plus de deux ans. Au reste, toutes les espèces de ce genre se multiplient facilement de marcottes, ou par le couchage.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XX.

Deux branches de *Magnolia yulan*, l'une chargée de fleurs, et l'autre de feuilles.

<sup>1</sup> Edition d'Aiton, en cinq volumes.

<sup>2</sup> Mémoires sur les Chinois, tom. III, pag. 441. — Desfontaines, Histoire des Arbres et Arbrisseaux, tom. II, pag. 2.

# PITTOSPORUM.

ORDO NATURALIS, PITTOSPOREÆ. *BROWN.*

PENTANDRIA MONOGYNIA. *LINN.*

## CHARACTER GENERICUS.

HABITUS : frutices vel arbores, inordinate ramosi; folia alterna, brevi petiolata, extipulata, integerrima; flores pentandri, terminales, axillaresve, subracemosi, bracteati.

FLORESCENTIA : calyx pentaphyllus, inferus, deciduus, foliolis subæqualibus.

COROLLA pentapetala, petalis, inferne in tubum cohærentibus, superne acutis, recurvis.

STAMINA quinque hypogyna, cum petalis alternantia, inclusa.

PISTILLUM : ovarium superum : stylus unicus; stygma subcapitatum.

PERICARPIMUM : capsula unilocularis stylo umbilicata, bi aut trivalvis, polysperma; valvulis medio septiferis; semina angulata septo inserta, duplici serie superposita : embryo minutus, prope umbilicum, inclusus albumine carnosus.

## SPECIES.

### PITTOSPORUM<sup>\*</sup> TOMENTOSUM.

PITTOSPORUM : foliis ob-ovali-oblongis, utrinque acutis, subtus ramulisque tomentosis, margine recurvis : floribus terminalibus.

---

Habitat in Nova Hollandia.

---

PLANTE ligneuse, haute de deux à trois pieds (8 décimètres), rameaux alternes, droits, peu feuillus, cylindriques, dont les plus jeunes sont couverts d'un duvet tomenteux, épais, et de couleur grise.

# PITTOSPORUM TOMENTOSUM.

57

FEUILLES alternes, très-ouvertes, entières, longues de deux à quatre pouces (1 décimètre) sur quinze ou dix-huit lignes (2 centimètres) de largeur, aiguës inférieurement, plus larges au sommet, et terminées par une pointe plus ou moins aiguë, glabres, et d'un vert foncé en-dessus, marquées en-dessous d'un duvet tomenteux, assez épais et roussâtre dans les jeunes feuilles; pétiole court, convexe en-dehors, applati intérieurement.

FLEURS d'un jaune pâle, disposées comme en ombelle à l'extrémité des jeunes rameaux.

CALICE composé de cinq folioles de couleur verdâtre, ouvertes, lancéolées, scarieuses sur les bords, et légèrement découpées.

COROLLE formée de cinq pétales droits dans leurs deux tiers inférieurs, et réunis par leurs bords, réfléchis au sommet, obtus.

ETAMINES cinq, plus courtes que la corolle; filets blancs, droits, aigus au sommet; anthères à deux loges, ovales, droites, attachées par le milieu, aiguës au sommet, bifurquées à la base.

PISTIL : ovaire supère, ovale, couvert de poils longs et très-nombreux; style droit; stygmate obtus, légèrement charnu.

FRUIT : non observé.

## OBSERVATIONS.

M. Robert Brown a devancé M. Richard dans la publication du nouvel ordre naturel des *Pittosporées*, en nous en donnant le caractère à la page 10 de ses Remarques géographiques sur la Botanique des terres australes, qui font partie de l'ouvrage du capitaine Flinders.

Le genre *Pittosporum* a été établi sur une espèce originaire des Canaries, et désignée dans divers auteurs sous le nom de *Pittosporum coriaceum*. Ce genre est formé des mots  $\pi\iota\tau\tau\alpha$ , résine, poix, et de  $\sigma\pi\omicron\rho\omicron\varsigma$ , semence, parce que les graines et la capsule contiennent une substance huileuse dont l'odeur a beaucoup d'analogie avec celle des résines.

Nous connoissons encore peu d'espèces de ce genre : j'en cultive à Malmaison trois qui sont distinctes de toutes celles décrites dans les divers auteurs; mais je ne puis leur assigner de caractères, parcequ'elles n'ont pas encore

## PITTOSPORUM TOMENTOSUM.

fleuri. Le *Pittosporum tomentosum*, dont je viens de donner la description, a porté des fleurs, pour la première fois, dans les mois de février et de mars 1811. Cette espèce a quelque analogie avec le *Pittosporum revolutum* et le *ferrugineum*; mais comme les phrases spécifiques qui caractérisent ces deux espèces ne lui conviennent pas, et que d'ailleurs il n'en existe aucune figure, j'ai cru convenable, afin d'éviter toute erreur, de la désigner sous le nom de *Pittosporum tomentosum*, qui seul la distingue de toutes les autres espèces connues.

Les *Pittosporum* sont des arbrisseaux ligneux, feuillus, et peu élevés : ils passent ici l'hiver dans l'orangerie, et sont très-propres à l'ornement de nos serres par la beauté de leur feuillage, dont ils sont toujours couverts. Les *Pittosporum undulatum* que l'on cultive à Malmaison ont acquis une hauteur de douze pieds; ils se couvrent ordinairement de fleurs dans le mois de mars. Toutes les espèces de ce genre pourroient être cultivées en pleine terre dans le midi de la France et en Italie.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XXI.

FIG. 1. Corolle étalée, pour faire voir la manière dont ses parties sont unies. 2. Une fleur dont on a ôté la corolle pour indiquer la position des étamines et du style. 3. Un pistil détaché et grossi.



## ERICA CONCINNA.

*Erica* : ramulis conferto-verticillatis, foliis senis, linearibus : floribus ad summitatem ramulorum ternis quinisve, brevi pedicellatis : corollis tubulosis, subarcuatis, pubescentibus; laciniis lato-ovalibus, obtusis, patulis; staminibus inclusis, muticis.

---

Habitat ad Caput Bonæ Spei.

---

PLANTE ligneuse, haute de quatre ou six pieds (2 mètres), glabre sur toutes ses parties, excepté la corolle et les ramillets, qui généralement sont disposés en verticilles, et rapprochés les uns des autres au-dessous du sommet de la tige ou des rameaux principaux.

FEUILLES disposées en verticilles de six, linéaires, longues de trois ou quatre lignes, convexes en-dessus, légèrement ciliées sur les bords.

FLEURS en tube, de couleur rose plus ou moins foncée, pubescentes, courtement pédicellées, comme rassemblées en faisceau, mais disposées trois à trois, ou en plus grand nombre, à l'extrémité des ramillets.

PÉDICELLE droit ou arqué, très-court, muni, vers la base, de deux petites bractées opposées.

CALICE formé de quatre folioles ovales dans leur moitié inférieure, scarieuse sur les bords, linéaire dans leur moitié supérieure, et marquées en-dehors d'un sillon longitudinal.

COROLLE en forme de tube, longue d'un pouce (2 centimètres), légèrement arquée, pubescente en-dehors, partagée à son limbe en quatre divisions ovales, obtuses, et un peu recourbées en-dehors.

ÉTAMINES : huit, plus courtes que la corolle, fixées autour d'un disque hypogyne : filets blancs, arqués en-dedans; anthères rapprochées en tube de couleur violette, formées de deux loges, réunies par leur base seulement.

PISTIL : ovaire supère, sphérique, déprimé, marqué de huit petites côtes : style droit, de même longueur que les étamines; stigmaté charnu, violet, comme divisé en quatre parties.

FRUIT : non observé.

---

#### OBSERVATIONS.

La plante que je viens de décrire a beaucoup d'analogie avec l'*Erica cylindrica*, mais elle en diffère essentiellement par ses feuilles, qui sont disposées six par six, et légèrement garnies de poils sur les bords; par ses corolles pubescentes; enfin par ses anthères dépourvues d'arête.

Nous cultivons l'*Erica concinna* à Navarre, où nous l'avons obtenue de graines semées en 1810; c'est une très-belle plante d'ornement, qui se couvre de fleurs pendant les mois de septembre et d'octobre.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXII.

*Une branche de l'Erica concinna garnie de fleurs.*

## PÆONIA MOUTAN. Var. *b*.

### OBSERVATIONS.

La variété *b* du *Moutan*, dont je donne la figure à la planche XXIII, présente des différences sensibles qui n'ont pas échappé aux yeux des cultivateurs. Il est facile de distinguer ces plantes d'après le port et les caractères suivants.

Le *Pæonia moutan*, dont j'ai donné la figure à la planche I<sup>re</sup> de cet ouvrage, diffère essentiellement de la variété *b*, 1<sup>re</sup> par ses branches, qui sont constamment moins grosses, moins longues, et dont les nœuds sont plus rapprochés; 2<sup>re</sup> par ses feuilles, plus petites et plus grêles dans toutes leurs parties, mais plus droites, et d'un vert obscur; 3<sup>re</sup> par les fleurs, aussi moins grandes, mais plus serrées et d'un rouge beaucoup plus foncé; 4<sup>re</sup> enfin, par ses pétales, divisés moins profondément que dans la variété *b*, et dont le reflet est d'une belle couleur nacré.

En août 1814, j'ai parcouru la riche collection des dessins qui se trouvent dans la bibliothèque de la Compagnie des Indes à Londres. Ce précieux dépôt renferme presque toutes les plantes de la Chine que nous cultivons; et il est curieux d'observer, d'après ces dessins, que ces plantes viennent plus fortes dans notre climat que dans leur pays natal. Plusieurs dessins du *Moutan* que j'ai vus m'ont constamment offert la plante dont j'ai donné la figure à la planche I<sup>re</sup> de cet ouvrage. La variété *b*, qui déjà est très-répandue en Angleterre, auroit-elle donc été obtenue en Europe? Depuis plusieurs années je cultive plusieurs pieds de *Moutan* à Malmaison et à Navarre; ils n'ont jamais montré que très-peu de différence dans la couleur des pétales; cependant je pense qu'ils sont susceptibles d'en offrir de très-grandes. Le premier pied de *Pæonia moutan* apporté à Londres a donné quelques graines dans le jardin de Kew, où elles ont germé. Cela nous donne la certitude de multiplier ces plantes magnifiques par les graines, aussitôt qu'on les cultivera dans le midi de la France et dans l'Italie.

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIII.

Fig. 1. Une capsule bien formée, mais dont les graines ne sont pas parvenues à un degré de maturité parfaite.

# ZIERIA.

ORDO NATURALIS, RUTACEÆ. *Juss.*

TETRANDRIA MONOGYNIA. *Lin.*

## CHARACTER GENERICUS.

HABITUS : frutices erecti, ramosi : folia opposita, trifoliata, punctata, extipulata : pedunculi axillares, terminalesve, simplices aut racemosi.

FLORESCENTIA : calyx inferus, quadripartitus, persistens.

COROLLA tetrapetala, fundo calycis inserta, petalis calyce duplo longioribus et cum lacinii ejusdem alternantibus.

STAMINA quatuor, disco hypogyno inserta, calyci opposita, inclusa : filamenta basi intus uniglandulosa : antheræ globosæ, medio dorso affixæ, introrsæ, biloculares, loculis appositis, sulco longitudinali dehiscentibus.

PISTILLUM : ovarium superum, quadrilobatum : stylus unicus, brevis : stygma capitatum, quadrifidum.

PERICARPIMUM : capsula quadriloba, lobis divaricatis, unilocularibus, monospermis, intus sulco longitudinali dehiscentibus. Semen compresso-ovatum, striis longitudinalibus notatum : embryo haud visus.

## SPECIES.

### ZIERIA SMITHII.

*ZIERIA* : ramulis folisque pilosiusculis ; foliis lanceolatis, planis ; racemis foliorum longitudine, multifloris.

---

Habitat in Nova Hollandia.

---

PLANTE ligneuse, haute de quatre à six pieds (2 mètres), recouverte d'une écorce brune, ponctuée, ainsi que les feuilles et toutes les

autres parties de la plante; les jeunes rameaux sont parsemés de poils courts à peine visibles à l'œil nu.

**RAMEAUX** opposés, ouverts, peu feuillus.

**FEUILLES** opposées, longues d'un à deux pouces (4 centimètres), ternées, parsemées de points glanduleux, comme celles des orangers, membraneuses, et légèrement pubescentes; pétiole commun, généralement plus court que les folioles, convexe en-dehors, aplati en-dedans; folioles lancéolées, sessiles, articulées, planes, terminées, à la base et au sommet, par une pointe égale.

**FLEURS** petites, de couleur blanche, disposées sur une grappe axillaire de même longueur que les feuilles.

**CALICE** infère, persistant, divisé en quatre parties droites; marqué, ainsi que les pétales, de points glanduleux.

**COROLLE** composée de quatre pétales attachés à la base du calice, deux fois plus longs que lui, et alternant avec ses divisions.

**ÉTAMINES** : quatre, fixées sur un disque hypogyne, opposées aux divisions du calice; filets blancs, arqués intérieurement : anthères sphériques, fixées par le milieu, formées de deux loges opposées, qui s'ouvrent en-dedans par un sillon longitudinal.

**PISTIL** : ovaire supère, glabre, ponctué, partagé à son sommet en quatre lobes; un seul style, droit, plus court que les étamines; stygmate en tête, marqué de quatre sillons.

**FRUIT** : capsule formée de quatre lobes divergents, unis par leur base; chaque lobe ovale, comprimé, s'ouvrant par l'angle intérieur, et renfermant une graine noire, marquée de stries longitudinales.

---

#### OBSERVATIONS.

Le genre *Zieria* a été établi par le chevalier Smith, qui en a donné le caractère dans le quatrième volume des Transactions Linnéennes; il a dédié ce genre à M. Zier, son ami, qui est un naturaliste distingué. Nous cultivons depuis plusieurs années, à Malmaison et à Navarre, le *Zieria Smithii*. Les

herbiers nous font connoître trois espèces de ce genre, outre celle dont je viens de donner la description. Ces trois espèces peuvent être désignées par les noms suivants, et reconnues par les caractères que je leur assigne.

## SAVOIR :

## ZIERIA MICROPHYLLA.

*Zieria* : ramulis, foliolisque subtus sericeis; foliolis linearibus, supra glabris, margine recurvis; pedunculis axillaribus, subtrifloris.

## ZIERIA MACROPHYLLA.

*Zieria* : ramulis pulverulaceis; foliolis oblongis utraque glabris, planis; racemis petiolorum longitudine paucifloris.

## ZIERIA LAEVIGATA.

*Zieria* : ramulis folisque glaberrimis; foliolis linearibus, utroque margine recurvis; racemis foliorum longitudine, paucifloris.

Toutes ces plantes sont originaires de la Nouvelle-Hollande. Nous cultivons avec succès le *Zieria Smithii* dans l'orangerie, et il est probable que les trois autres espèces dont je viens de donner les caractères exigent la même culture.

Ce nouveau genre augmente la famille des *Rutacées*, à laquelle il appartient. Toutes les parties de ces plantes sont pourvues de points glanduleux, qui secrètent une liqueur visqueuse très-aromatique.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIV.

FIG. 1. Une fleur vue par derrière. 2. Un idem vue par devant. 3. Un pétale. 4. Une fleur grossie, dont on a ôté les pétales pour faire voir l'ovaire, les étamines et les glandes auxquelles elles sont attachées. 5. Une étamine. 6. Un ovaire fécondé. 7. Un fruit vu par derrière. 8. Un idem vu par devant. 9. Une graine entière. 10. Une idem coupée verticalement.

# LOPEZIA.

ORDO NATURALIS, ONAGRÆ. JUSS.

DIANDRIA MONOGYNIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. CAVAN. Icon. tom. I. pag. 12. tab. 18.

## SPECIES.

### LOPEZIA RACEMOSA.

LOPEZIA : caule diffuso, suffrutescente, tetragono; foliis ovali-lanceolatis, serratis.

---

Habitat in imperio Mexicano frequens juxta Valladolid.

---

PLANTE annuelle ou bisannuelle, sous-ligneuse; tige diffuse, longue de trois ou quatre pieds (1 mètre), rameuse, presque entièrement glabre, marquée de quatre angles peu marqués dans les jeunes rameaux.

FEUILLES alternes, ovales, lancéolées, longues d'un pouce et demi à deux pouces (5 centimètres), inégalement dentées sur les bords et marquées en-dessous de veines transversales parallèles entre elles.

PÉTIOLÉS beaucoup plus courts que les feuilles, marqués intérieurement d'un sillon peu profond.

GRAPPE terminale, lâche, composée d'un grand nombre de fleurs blanches et rouges, longuement pédicellées et éloignées les unes des autres dans l'état parfait de floraison.

PÉDICELLE filiforme, uniflore, muni à sa base d'une seule bractée, ovale.

CALICE supère, coloré, divisé à son limbe en quatre folioles caduques.

COROLLE formée de quatre pétales qui se présentent sous des formes diverses; deux de ces pétales sont, en général, plus grands que les autres, ovales, échancrés au sommet et supportés par un onglet alongé; les deux autres, constamment plus petits et plus étroits, sont légèrement charnus et pourvus, vers leur base, de tubercules ou de lames très-petites, disposés sans aucun ordre régulier.

ÉTAMINES: deux, dont une est fertile et l'autre avorte constamment; filet droit, blanc, cannelé et membraneux vers la base, aigu au sommet; anthère jaune, linéaire, fixée par le milieu, biloculaire; l'étamine avortée est généralement dirigée vers le bas de la fleur; sa forme est très-variable; sa couleur est la même que celle de l'étamine fertile, et elle se termine le plus souvent par un tubercule sphérique.

PISTIL: ovaire infère; style droit, entouré inférieurement d'une gaine formée par la réunion des pétales; stygmate frangé.

FRUIT: capsule sphérique, s'ouvrant par le sommet et jusque vers son milieu seulement en quatre valves; divisée intérieurement en quatre loges qui renferment plusieurs graines très-petites, attachées à la base d'un réceptacle central et quadrangulaire.

#### OBSERVATIONS.

Le genre *Lopezia* a été établi par Cavanilles en l'honneur de Thomas Lopez, qui a écrit sur l'histoire naturelle du nouveau monde. Ce nouveau genre a été considéré par presque tous les auteurs comme devant appartenir à la première classe du système sexuel. M. de Jussieu, dans un mémoire qu'il a publié sur les onagres<sup>1</sup>, place le genre *Lopezia* dans la deuxième classe du système sexuel; je suis entièrement de l'avis de ce savant estimable, et je le considère comme éta-

<sup>1</sup> Annales du Muséum, vol. III, pag. 3:5.



mine avortée ce que tous les auteurs ont décrit comme cinquième pétale : cette partie se présente toujours avec des formes diverses ; mais généralement elle est terminée par une membrane pliée suivant sa longueur, et d'une forme plus ou moins régulière. Nous voyons un très-grand nombre de plantes dans lesquelles les étamines se changent en pétales plus ou moins marqués ; les roses, les plus belles et les plus agréables de toutes les fleurs, nous en offrent continuellement des exemples.

Toutes les espèces du genre *Lopezia* connues jusqu'à ce jour sont originaires du Mexique ; elles sont annuelles ou bisannuelles, et peuvent se conserver dans l'orangerie pendant l'hiver. Les auteurs ont décrit trois espèces de *Lopezia* ; savoir : le *Lopezia racemosa*, dont je donne une figure à la planche XXV de cet ouvrage ; le *Lopezia hirsuta*, et le *Lopezia coronata*. Cette dernière espèce, que je cultive à Malmaison depuis mon retour d'Amérique, a été publiée par l'auteur du Botanist Repository, qui en a donné la figure à la planche DLI. On doit ajouter à ces trois espèces une quatrième que je désigne sous le nom de *Lopezia pumila*. Celle-ci, que j'ai trouvée une seule fois sur les collines de Guanajuato, dans le Mexique, sera gravée dans notre Flore. Je me suis déterminé à donner la gravure du *Lopezia racemosa*, parcequ'elle fait partie de la collection des vélins de Malmaison, et qu'elle représente la plante au moment où la floraison se développe. Il sera facile de reconnoître et de distinguer les espèces dont je viens de parler aux caractères que j'en présente ici.

## LOPEZIA HIRSUTA.

*Lopezia*: caule erecto, suffrutescente, tereti; foliis ovali-lanceolatis, subtus, ramulisque pubescentibus.

## LOPEZIA CORONATA.

*Lopezia*: caule simplici, erecto, herbaceo; foliis lanceolato-ovalibus, inaequaliter serratis, lucidis.

## LOPEZIA PUMILA.

*Lopezia*: caule simplici, hirsuto, tereti; foliis brevi petiolatis, ovalibus, denticulatis; utrinque pilosiusculis.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XXV.

FIG. 1. Une fleur grossie et vue en-dessus.

<sup>1</sup> Jacq. Collect. suppl. pag. 5, tab. 15, fig. 4.

# RHEXIA.

ORDO NATURALIS, MELASTOMÆ. JUSS.

OCTANDRIA MONOGYNIA. LINN.

## SPECIES.

### RHEXIA PENDULIFOLIA.

RHEXIA : foliis cordatis, lanceolato-ovalibus, quinque-nerviis, denticulatis, pendulis, glaberrimis;  
Panicula terminali : floribus decandris, minutis ; antheris simplicibus.

---

Habitat in Gujanâ.

---

PLANTE annuelle, haute de un à deux pieds (4 à 5 décimètres), rameuse et feuillue dès sa base ; tige et rameaux quadrangulaires, rougeâtres, parsemés de poils courts.

FEUILLES opposées, longues de un à deux pouces (5 centimètres), pendantes, marquées sur les côtés de petites dentelures, échan-crées en cœur à la base, aiguës au sommet et relevées en-dessous de cinq nervures rougeâtres.

PÉTIOLÉS beaucoup plus courts que les feuilles, cylindriques, parsemés de quelques poils.

PANICULE terminale, composée d'un nombre peu considérable de petites fleurs blanches portées sur des pédicelles très-minces et munis de petites bractées.

CALICE supérieur, glabre, ovale inférieurement, rétréci à la gorge, partagé à son limbe en cinq divisions linéaires, droites et aiguës.

## RHEXIA PENDULIFOLIA.

69

COROLLE blanche, composée de cinq pétales ovales, un peu plus longs que les divisions du calice.

ÉTAMINES: dix, droites, incluses; filets blancs; anthères ovales, de couleur rose.

PISTIL: ovaire supère, sphérique; style droit, stygmate aigu.

FRUIT: capsule s'ouvrant par le sommet, divisée intérieurement en trois loges, renfermant chacune un grand nombre de petites graines.

---

### OBSERVATIONS.

La plante que je viens de décrire est originaire de la Guyane, d'où les graines ont été envoyées par M. Martin à Sa Majesté l'impératrice Joséphine. C'est pendant le mois de mars 1810 que cette *Rhexia* a fleuri dans l'une des petites serres chaudes du fleuriste de Malmaison.

Le *Rhexia pendula* a quelque analogie par le port avec le *Rhexia aquatica*; mais il en diffère essentiellement par ses fleurs, dont les pétales sont réguliers, et par les étamines, qui sont droites et dépourvues d'appendices; tandis que dans le *Rhexia aquatica*, elles sont disposées en faisceau, arquées (*declinatae*) comme dans les *Amaryllis*, et que les anthères sont pourvues d'un appendice à leur base.

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXVI.

FIG. 1. Une fleur entière vue avant son développement, et grossie. 2. Id. coupée verticalement et dont on a enlevé une partie du calice pour faire voir la position de l'ovaire, l'insertion des étamines et de la corolle. 3. Un ovaire grossi.

## RHEXIA GLANDULOSA.

RHEXIA: foliis ovalibus, tri-quinquenerviis, crenulatis, supra convexis, utrinque glaberrimis; floribus subsolitariis terminalibus, axillaribusve, decandris: staminum filamentis apice biglandulosis.

---

Habitat in Gujana.

---

PLANTE herbacée, haute d'un pied (3 décimètres), rameuse et feuillue dès sa base; tige et rameaux cylindriques, pubescens, de couleur rouge foncée.

FEUILLES opposées, longues de six à huit lignes (1 centimètre), ovales, crénelées sur les bords, convexes en-dessus, concaves en-dessous, et relevées de trois ou cinq nervures peu saillantes.

PÉTIOLLES beaucoup plus courts que les feuilles.

FLEURS blanches, terminales ou axillaires, pédicellées.

CALICE supère, glabre, ovale inférieurement, rétréci à sa gorge, partagé à son limbe en cinq divisions linéaires.

COROLLE composée de cinq pétales ovales, blancs, marqués intérieurement à leur base de deux taches rouges.

ÉTAMINES: dix, de couleur rouge; filets charnus, légèrement arqués et pourvus au sommet de deux corps glanduleux de couleur jaune; anthère droite, simple.

PISTIL: ovaire supère, style droit, stygmate aigu.

FRUIT: capsule sphérique, divisée intérieurement en trois loges qui renferment un grand nombre de graines très-petites.

## OBSERVATIONS.

Le *Rhexia glandulosa* est, ainsi que le *Rhexia pendulifolia*, originaire de la Guyane. Cette nouvelle espèce n'a aucun rapport avec celles qui sont déjà connues; semée à la même époque que le *Rhexia pendulifolia*, elle a fleuri un mois plus tard, c'est-à-dire, en avril; mais ses fleurs ont été d'une plus longue durée que celles du *Rhexia pendulifolia*. Cette nouvelle espèce ne s'est pas élevée dans nos serres à plus d'un pied (3 décimètres). Elle étoit rameuse dès sa base et garnie de feuilles très-petites. Ses fleurs, très-analogues à celles du *Leptospermum juniperinum*<sup>1</sup>, sont remarquables par deux corps glanduleux qui se trouvent placés au sommet et sur les côtés des filets.

Il est extrêmement difficile de cultiver des *Melastomacées* dans nos serres, et de les conserver. Les graines de ces plantes, nouvellement arrivées de l'Amérique et des Indes, lèvent assez facilement; mais les jeunes plantes périssent bientôt. Pendant cinq années de suite que j'ai fait semer des graines de *Melastomacées* avec le plus grand soin, je n'en ai pu sauver que trois espèces, qui sont le *Rhexia pendulifolia*, figuré à la planche XXVI de cet ouvrage; le *Rhexia glandulosa*, à la planche XXVII; et le *Melastoma malabathrica*, qui n'a que deux ans de semis, et n'a pas encore fleuri. Les autres espèces de cet ordre qui se cultivent à Malmaison sont le *Melastoma eleagnoides* et le *Cymosa*<sup>2</sup>. Ce dernier, par son fruit supère et capsulaire, doit être rapporté au genre *Rhexia*.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XXVII.

FIG. 1. Une fleur entière vue par-devant. 2. Id. dont on a enlevé une partie du calice pour faire voir la disposition de l'ovaire, des étamines et de la corolle. 3. Un pétale vu en-dedans. 4. Une étamine. 5. Un pistil dont l'ovaire est grossi. 6. Coupe transversale d'un ovaire.

<sup>1</sup> Ventenat. Jard. de Malm. tab. 89.

<sup>2</sup> Vent. Jard. de Malm. pag. 8, pl. 14.

## ERICA PURPUREA.

ERICA : ramis ramulisque virgatis; foliis octonis, senisve, linearibus, patenti-recurvis, rigidis; floribus infra ramulorum apicem confertim verticillatis, cylindraceo-tubulosis, arcuatis; antheris muticis.

---

Habitat ad Caput Bonæ Spei.

---

PLANTE ligneuse, haute de quatre à six pieds (1 à 2 mètres), glabre sur toutes les parties, excepté les jeunes rameaux qui, vus à la loupe, paroissent couverts d'un très-grand nombre de petits poils blancs.

RAMEAUX verticillés, droits, cylindriques, garnis de feuilles dans toute leur longueur.

FEUILLES linéaires, disposées en verticille de huit ou de six, longues de cinq à sept lignes (1 centimètre), ouvertes, légèrement arquées, convexes et d'un vert très-brillant en-dessus, marquées en-dessous d'un sillon longitudinal formé par le bord recourbé des feuilles.

PÉTIOLE très-court, aplati.

FLEURS en tube, d'un beau rouge, disposées une à une dans les aisselles des feuilles, ouvertes, réfléchies, courtement pédicellées et comme rassemblées en épi au-dessous du sommet des jeunes rameaux.

PÉDICELLE très-court, uniflore, muni vers le sommet de trois bractées linéaires.

CALICE, composé de quatre folioles ovales, aiguës, de couleur verte, pourvues intérieurement d'une liqueur visqueuse.

COROLLE tubulée, légèrement arquée, longue d'un pouce (2 centimètres), régulièrement évasée; limbe droit, divisé en quatre parties ovales, plus courtes que larges.

## ERICA PURPUREA.

75

ETAMINES : huit, plus courtes que la corolle, attachées autour d'un disque hypogyne; filets très déliés, légèrement arqués intérieurement dans leur tiers supérieur; anthères ovales, composées de deux loges réunies par leur base, écartées par leur sommet, et s'ouvrant en-dehors par un trou rond.

PISTIL : ovaire supère, glabre, oblong, marqué extérieurement de huit côtes portant chacune à la base et au sommet un petit tubercule; style droit, plus long que la corolle; stygmate légèrement charnu, comme divisé en quatre parties.

FRUIT : capsule à quatre loges.

---

### OBSERVATIONS.

L'*Erica purpurea* est originaire du Cap de Bonne Espérance; elle se présente sous la forme d'un joli arbrisseau : cette espèce, que je cultive à Navarre depuis plusieurs années, est remarquable par ses rameaux droits, garnis de feuilles verticillées au nombre de six ou de huit, par la disposition de ses fleurs, qui sont cylindriques, arquées et d'une belle couleur rouge. L'*Erica purpurea* est une très-belle plante d'ornement, et mérite de fixer l'attention des cultivateurs.

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXVIII.

FIG. 1. Une portion de rameau pour faire voir la manière dont les feuilles sont disposées. 2. Une feuille isolée et vue par derrière. 3. Un calice supporté par le pédicel pourvu de trois bractées vers le sommet. 4. Les étamines et le pistil séparés de la corolle et vus dans leur position naturelle. 5. Une étamine isolée. Le pistil grossi pour faire voir la forme de l'ovaire et du stygmate.

## HIBISCUS SABDARIFFA.

*Hibiscus* : foliis dentatis, inferioribus ovalibus, superioribus trilobis, basi subcuneatis. Calyce exteriori subduodecim-fido; caule inermi; floribus magnis, axillaribus subsessilibusque.

---

Habitat in Indîa.

---

PLANTE herbacée, haute de deux à quatre pieds (1 mètre), rameuse dès sa base, feuillue.

TIGE et rameaux droits, cylindriques, de couleur rose-foncée, glabres.

FEUILLES alternes, longues de quatre ou six pouces (15 centimètres), pétiolées, dentées sur les bords, comme terminées en forme de coin; entières à leur base, veinées en-dessous; les plus inférieures ovales, les supérieures partagées en trois lobes.

PÉTIOLLES longs de deux à trois pouces (6 centimètres), presque cylindriques, marqués intérieurement d'un léger sillon garni de poils, pourvus au sommet d'une glande plus ou moins visible et qui est quelquefois placée au bas de la nervure principale de la feuille.

STIPULES : deux, opposées, subulées, caduques, placées près de la base des pétioles.

FLEURS : disposées une à une et presque sessiles dans les aisselles des feuilles, longues de deux pouces (4 centimètres), d'un jaune pâle, et marquées, vers la gorge, de taches d'un rouge-pourpre.

CALICE : double, légèrement charnu, coloré, campanulé, persistant; l'extérieur plus petit que l'intérieur, partagé jusque vers son milieu en douze divisions ou à-peu-près; elles sont inégalement triquètres et terminées en pointe; l'intérieur n'a que cinq divisions ovales, aiguës, et devient d'un rouge très-vif lors de la maturité du fruit.

COROLLE trois fois plus grande que le calice, d'un jaune pâle, com-



posée de cinq pétales, marqués à leur base de taches rouges; pétales oblongs, arrondis et très-larges au sommet, rétrécis en forme de coin vers la base, et marqués chacun en-dedans et vers leur milieu d'une tache de couleur pourpre-foncée.

ÉTAMINES nombreuses, réunies inférieurement en un tube cylindrique, charnu et coloré; filets courts, très-déliés, portant chacun une petite anthère jaune.

PISTIL : ovaire pyramidal; style simple, droit, partagé jusque vers son milieu en cinq filets; cinq stygmates en forme de tête d'un rouge vif et tomenteux.

FRUIT : capsule à cinq loges.

#### OBSERVATIONS.

L'*Hibiscus* est un genre très-ancien et très-nombreux en espèces. Le sud des Etats-Unis, l'Inde et l'Amérique méridionale fournissent la plus grande partie de ses plantes; elles demandent donc par conséquent à être presque toutes cultivées en serre-chaude. Plusieurs des espèces de ce genre offrent une utilité marquée, indépendamment de la propriété générale attachée à toute la famille.

Dans toute l'Amérique méridionale on cultive l'*Hibiscus esculentus*, et on en mange le fruit. L'*Hibiscus abelmoschus* offre un remède certain contre la piqure des serpents. Le *Sabdariffa*, dont je donne ici la figure, planche XXIX, offre un aliment très-salutaire aux habitants de l'Inde et à ceux de tous les pays chauds. Ses feuilles, d'un goût acide semblable à celui de notre oseille, s'emploient aux mêmes usages que cette dernière plante. L'*Hibiscus sabdariffa* doit fixer l'attention de tous les habitants des pays chauds, et ils peuvent la cultiver comme plante potagère.

Pendant trois années que j'ai cultivé cette plante, il m'a été impossible d'en obtenir des fruits bien formés, ce que j'attribue à la température trop basse de nos jours et de nos nuits. Les feuilles, et sur-tout les jeunes, étoient d'une saveur acide très-agréable.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIX.

Un rameau de l'*Hibiscus sabdariffa* portant des fleurs.

# TRISTANIA.

ORDO NATURALIS, MYRTI. *Juss.*

POLYDELPHIA ICOSANDRIA. *LINN.*

## CHARACTER GENERICUS.

HABITES. Frutices erecti, omnibus partibus glanduloso-punctati. Folia decussatim opposita, vel alterna, integerrima. Pedunculi axillares multiflori.

FLORESCENTIA: calyx superus quinque dentatus, persistens.

COROLLA pentapetala, summo calycis tubo inserta ejusdem laciniis alterna.

STAMINA circiter viginti ibidem inserta et in quinque phalanges basi connata; antheræ medio dorso affixæ, globosæ.

PISTILLUM: ovarium inferum; stylus unicus; stigma obtusum.

PERICARPIMUM: capsula infera, trilocularis (sive quadrilocularis ex observationibus dom. Richard), polysperma; seminibus minutis receptaculo centrali affixis.

## SPECIES.

### TRISTANIA NERIIFOLIA ?

TRISTANIA: foliis oppositis, longo-lanceolatis, supra nitidis glabris, subtus glaucescentibus. Corymbis axillaribus longiuscule pedunculatis.

---

Habitat in Nova Hollandia.

---

PLANTE ligneuse, haute de trois ou six pieds (1 ou 2 mètres), rameuse

---

<sup>o</sup>  
<sup>1</sup> *Melaleuca salicifolia*. Andr. Botan. Reposit. tab. 485. *Melaleuca neriifolia*. Sims. Botanic. Magaz. tab. 1058. *Tristania nereifolia*. Rob. Brown Hort. Kew. edit. de 1812, t. IV, p. 417.

dès sa base, garnie de feuilles, et munie sur toutes ses parties de points glanduleux qui sécrètent une liqueur d'une odeur aromatique très-prononcée.

RAMEAUX opposés, droits, cylindriques inférieurement, marqués vers leur sommet d'une petite crête ou carène formée par la décurrence des pétioles.

FEUILLES opposées, longues de deux ou quatre pouces (5 à 7 centimètres) sur six ou huit lignes de largeur (15 millimètres), ouvertes, très-entières, coriaces, glabres et d'un vert foncé en-dessus, glauques en-dessous et marquées de petits points glanduleux très-nombreux.

PÉTIOLES très-courts, sillonnés en-dedans, convexes en-dehors.

CORYMBES axillaires supportés par un pédoncule commun légèrement comprimé.

CALICE supère, campanulé, partagé en son limbe en cinq divisions presque droites, ovales, obtuses, éloignées les unes des autres et scarieuses sur les bords. Entre chaque division du calice il se trouve un point glanduleux de couleur rougeâtre.

COROLLE d'un beau jaune, formée de cinq pétales attachés à la gorge du calice et alternes avec ses divisions; pétales droits, ovales, terminés inférieurement par un onglet élargi et court.

ÉTAMINES : droites, au nombre de vingt ou à-peu-près, attachées au sommet du calice, légèrement unies par leur base et disposées en cinq faisceaux; filets droits, jaunes, de grandeur inégale, amincis au sommet; anthère jaune, sphérique, formée de deux loges réunies par un connectif charnu et glanduleux.

PISTIL : ovaire infère, terminé par un style droit, arqué vers le sommet; de même longueur et de même couleur que les étamines; stygmate obtus.

FRUIT : capsule infère ou demi-infère, divisée inférieurement en trois ou quatre loges qui s'ouvrent par le sommet et renferment un grand nombre de graines attachées à un réceptacle central.

## OBSERVATIONS.

Depuis 1808 on cultive le *Tristania neriifolia* à Malmaison. Cette plante avoit été envoyée d'Angleterre sous le nom de *Crowea nereifolia*; mais, voyant qu'elle n'appartient pas à ce genre, et que je ne pouvois la rapporter à aucun autre connu, j'en avois fait un nouveau genre, que j'eusse publié, si M. Robert Brown ne m'avoit devancé, en publiant cette même plante sous le nom de *Tristania* à la page 415 du quatrième volume de l'Hortus Kewensis, édition de 1812.

Ce nouveau genre a la plus grande affinité avec les *Melaleuca*, et n'en diffère véritablement que par la longueur des étamines, la nature de son calice, et la disposition de ses fleurs. La réunion des étamines en faisceaux est peu marquée, et ne se distingue pas sur un assez grand nombre de fleurs qui n'ont pas acquis tout leur degré de développement.

Les détails que je donne de cette plante ont été dessinés d'après nature par M. le professeur Richard, que j'ai souvent eu occasion de citer, et auquel je rends toujours avec plaisir un nouveau témoignage de ma gratitude pour les savans conseils qu'il me donne, ainsi qu'à tous les botanistes qui l'approchent.

Le *Tristania neriifolia* est une très-belle plante d'ornement, et doit être cultivée dans la serre d'orangerie. On la multiplie facilement de boutures ou par couchage en la tenant sous des baches tempérées.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XXX.

FIG. 1. Une fleur entière considérablement grossie. 2. Coupe verticale d'une fleur pour faire voir la position de l'ovaire, l'insertion et la disposition des étamines, la forme et l'insertion des pétales. 3. Une anthère avec une partie du filet vue par devant. 4. Id. vue par derrière. 5. Partie supérieure du style pour montrer la forme du stygmate. 6. Section verticale d'un ovaire indiquant l'existence de quatre loges.

# PIMELEA.

ORDO NATURALIS, THYMELEÆ. JUSS.

DIANDRIA MONOGYNIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. SMITH, New. Holl. I. p. 31. R. BROWN, Prod. Flor. Nov. Holl. pag. 359.

## SPECIES.

### PIMELEA LINIFOLIA.

PIMELEA: involueris tetraphyllis; foliis late ovalibus, utrinque glabris, perianthii tubo articulato, sericeo; foliis oppositis, linearibus, brevi petiolatis.

---

Habitat in Nova Hollandia.

---

PLANTE ligneuse, haute de deux à trois pieds (1 mètre), rameuse dès sa base; rameaux opposés, peu ouverts, grêles, cylindriques, rougeâtres, feuillus.

FEUILLES opposées en croix, très-rapprochées les unes des autres, droites ou ouvertes, longues de six à huit lignes (15 millimètres), sur une ou deux (2 millimètres) de largeur, également aiguës à la base et au sommet, glabres, de couleur verte, et marquées en-dessous d'une seule nervure, qui n'est autre chose que le prolongement du pétiole.

PÉTIOLE très-court, sillonné en-dedans, convexe en-dehors.

FLEURS ramassées en tête à l'extrémité des jeunes rameaux, fixées sur un réceptacle sphérique, couvert de poils blancs, et entourées d'un involucre qui tombe après la floraison.

INVOLUCRE composé de quatre folioles ovales, plus courtes que les fleurs, membraneuses, glabres, et de couleur verte.

CALICE infère, blanc, couvert de poils longs extérieurement; à tube cylindrique, droit et articulé au-dessus de l'ovaire, limbe ouvert, partagé en quatre divisions ovales, beaucoup plus courtes que le tube du calice.

COROLLE. Il n'y en a pas.

ÉTAMINES: deux, attachées au sommet du calice, et alternes avec ses divisions; filets blancs, très-courts; anthères ovales, droites, d'un beau jaune.

PISTIL: ovaire, glabre, très-petit, supporté par un court pédicelle; style droit, naissant au-dessous du sommet de l'ovaire; stygmate simple.

FRUIT: une seule graine couverte d'un péricarpe membraneux, de consistance dure et enveloppé dans la base du calice qui persiste.

---

#### OBSERVATIONS.

Le genre *Pimelea* a été établi par Smith; Labillardière, dans sa Flore de la Nouvelle Hollande, nous a fait connoître six espèces de ce genre, et Robert Brown en a décrit trente-quatre dans son *Prodromus Floræ Novæ Hollandiæ*.

Il est curieux d'observer que ce nouveau genre est le plus riche en espèces parmi ceux qui appartiennent à la famille des *Thymelées*.

Labillardière nous apprend que les habitants de la Nouvelle Hollande emploient les écorces des diverses espèces de *Pimelea* pour faire des cordages. Cette propriété est commune à plusieurs plantes de la même famille. Les habitants des

PIMELEA LINIFOLIA.

81

Antilles tirent, on sait, un grand parti des écorces du *Lagetto* ou bois à dentelle.

Il est à présumer que plusieurs espèces de *Pimelea* offrent aux naturels de la Nouvelle Hollande un caustique puissant, de même que le genre *Daphné* en offre aux habitants de la France, à ceux du Mexique et du Pérou.

Les *Pimelea* sont des plantes d'un port agréable et doivent être tenues dans l'orangerie pendant l'hiver. Je cultive depuis plusieurs années le *Pimelea linifolia* ; c'est la seule espèce de ce genre qui me soit parvenue vivante.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXI.

*Un rameau du Pimelea linifolia portant des fleurs.*

# HELIOTROPIUM.

ORDO NATURALIS, BORRAGINEÆ. JUSS.

PINTANDRIA MONOGYNIA. LINN.

CHARACTER GENERICUS.

Vid. Juss. Gen. plant. pag. 130.

SPECIES.

## HELIOTROPIUM CORYMBOSUM.

HELIOTROPIUM : caule fruticoso, foliis ovali-lanceolatis, utrinque acutis, recurvis, supra retrorsum asperis, subtus reticulato-venosis, pilosis; spicis dichotomis sub corymbosis.

---

Habitat in Peruvia.

---

PLANTE sous-ligneuse, haute de un à trois pieds (1 mètre), rameuse dès sa base, rarement droite; rameaux alternes, cylindriques, parsemés de poils blancs, feuillus, souvent tortueux et couchés sur terre.

FEUILLES alternes, longues de deux à trois pouces (5 centimètres) membraneuses, également aiguës à la base et au sommet, garnies en-dessus de poils nombreux, courts et piquants, lorsqu'on passe le doigt sur la feuille de bas en haut; veinées en-dessous et garnies de poils moins rudes que ceux de la face supérieure.

PÉTIOLÉS très-courts, convexes en-dehors, aplatis intérieurement.

FLEURS: toutes disposées du même côté sur un épi dichotome et terminal.



CALICE infère, persistant, divisé jusqu'à sa base en cinq folioles linéaires, subulées et droites.

COROLLE hypocratériforme, de couleur de lilas tendre, mêlée de blanc; tube droit, cylindrique, trois fois plus long que le calice; limbe campanulé, marqué de dix plis et divisé en cinq parties échancrées à leur sommet.

ÉTAMINES: cinq, attachées à la base de la corolle et plus courtes que son tube; filets blancs; anthères droites, rapprochées de manière à former un tube.

PISTIL: ovaire supérieur; style droit de même longueur que les étamines; stigmaté en tête et comme divisé en deux.

FRUIT: quatre graines nues, contenues dans le fond du calice, qui persiste.

---

#### OBSERVATIONS.

La plante que je viens de décrire nous a été envoyée d'Angleterre il y a plusieurs années, sous le nom de *Heliotropium grandiflorum*; et James Donn l'a désignée sous ce même nom<sup>1</sup>. Curtis, à la planche 1609 de son Botanical Magazine, vient de donner une petite figure de cette plante, et la considère comme la même que celle publiée par les auteurs de la Flore du Pérou, sous le nom de *Heliotropium corymbosum*<sup>2</sup>.

Si la culture ne nous fournissait pas tous les jours des exemples de la grande différence qui peut exister entre la plante cultivée et celle venue dans son sol natal, je serais autorisé à regarder cet *Heliotrope* comme une espèce vraiment nouvelle, et je lui eusse conservé le nom d'*Heliotropium grandiflorum*.

L'*Heliotropium corymbosum* est une très-belle plante d'ornement; elle a les plus grands rapports avec l'*Heliotropium peruvianum*. Cependant il est facile de la distinguer par ses tiges et ses rameaux, généralement plus grands, tortueux, moins feuillus et beaucoup moins pubescens; par ses épis, plus grands, plus lâches, plus divisés, et sur-tout enfin par ses fleurs, qui répandent une odeur douce de miel.

Ces deux espèces d'*Heliotrope* exigent la même culture.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXII.

Une branche de *Heliotropium corymbosum*.

---

<sup>1</sup> Hort. Cantabrig. 6<sup>e</sup> édit. p. 42.

<sup>2</sup> Flor. Péruv. vol. II, pag. 2, tab. 107, fig. a.

## MAGNOLIA MACROPHYLLA.

MAGNOLIA : foliis amplis, sub-cuneato oblongis, basi profunde cordatis, subtus glaucis, villosiusculis, deciduis.

---

Habitat in regionibus occidentalibus fluvii Tenassée.

---

PLANTE ligneuse, haute de douze à quinze pieds (4 à 5 mètres), tronc grêle, irrégulièrement droit, couvert d'une écorce lisse, blanchâtre, peu épaisse, rameaux alternes, étalés, tortueux.

FEUILLES alternes, situées au sommet des jeunes rameaux, étalées, longues de deux ou trois pieds (8 décimètres), membraneuses, plus larges au sommet qu'à la base, et terminées presque subitement en pointe, profondément échancrées à la base, glabres et d'un beau vert en-dessus, glauques en-dessous et couvertes d'un duvet soyeux, très-sensible dans les jeunes feuilles.

PÉTIOLLES longs de cinq à six pouces (15 centimètres), pubescens, convexes en-dehors, marqués en-dedans d'une gouttière peu profonde, et plus large dans sa moitié inférieure que dans la moitié supérieure.

STIPULES : deux, attachées sur les bords inférieurs du pétiole; longues et très-étroites, velues en-dehors, réunies par leur bord postérieur, caduques.

FLEURS terminales, droites, très-grandes, disposées une à une à l'extrémité des jeunes rameaux, et pourvues d'une odeur douce et très-agréable.

CALICE : il n'y en a pas.

COROLLE : composée de neuf pétales longs de quatre à cinq pouces (1 décimètre), blancs, charnus, disposés sur trois rangées, et marqués intérieurement et à leur base de couleur pourpre.

ÉTAMINES nombreuses, attachées au-dessous des ovaires, très-serrées,

filets blancs, courts, charnus; anthères droites, plus longues que les filets, formées de deux loges qui s'ouvrent longitudinalement en-dehors.

PISTIL : ovaires nombreux, rapprochés les uns des autres sur un réceptacle commun; style droit, très-court, terminé par un stygmate aigu.

FRUIT : non observé.

---

#### OBSERVATIONS.

Le *Magnolia macrophylla* est originaire des Etats-Unis, où il a été trouvé par le voyageur Michaux, si avantageusement connu pour les services importants qu'il a rendus à l'agriculture et à la botanique<sup>1</sup>. Cette nouvelle espèce a quelque analogie avec le *Magnolia tripetala* et le *Magnolia auriculata*, dont il diffère cependant par des caractères très-sensibles. Le *Magnolia macrophylla* passe l'hiver en pleine terre dans le climat de Paris, mais il demande à être planté dans un terrain humide et à l'abri de toute espèce de coup de vent : la grandeur de son feuillage, qui rappelle la végétation des tropiques, la beauté et l'odeur délicieuse de ses fleurs, doivent le faire rechercher pour l'ornement de nos parcs et de nos jardins.

Ce *Magnolia* se multiplie facilement de marcottes, comme toutes les autres espèces de ce genre; mais, comme il est encore très-rare, il est plus commun de le voir greffer par approche sur le *Magnolia tripetala*, qui donne des graines dans nos jardins depuis plusieurs années, et dont nous pouvons facilement nous procurer des pieds.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXIII.

FIG. 1. Un pétale séparé et vu en-dehors pour faire voir la tache dont il est marqué.

---

<sup>1</sup> Vid. Arb. forest. de l'Amér. sept. par Michaux fils, page 100.

## METROSIDEROS GLAUCA.

*METROSIDEROS*: foliis alternis, subcontortis, longe obverseque lanceolatis, trinerviis, mucronatis, glaucescentibus; floribus infra ramulos spicatim congestis.

---

Habitat in Nova Hollandia.

---

PLANTE ligneuse, haute de six à douze pieds (2 à 4 mètres), recouverte d'une écorce de couleur grise, peu épaisse et gercée.

RAMEAUX alternes, ouverts, réfléchis vers leur extrémité, inégalement cylindriques, rougeâtres, garnis de feuilles très-rapprochées les unes des autres à leur sommet et parsemés de poils blancs, longs et mous.

FEUILLES alternes, de couleur glauque, rapprochées les unes des autres, contournées à leur base, légèrement coriaces, ouvertes ou réfléchies, longues de trois ou quatre pouces (8 centimètres) sur six ou huit lignes de largeur (1 centimètre), ponctuées, plus larges vers le sommet qu'à la base et terminées par une petite pointe, marquées en-dessous de trois nervures saillantes, dont les deux latérales sont très rapprochées des bords de la feuille, qui souvent sont colorés en rouge.

PÉTIOLÉS très-courts, renflés en-dehors.

FLEURS d'un rouge vif, formant par leur disposition un épi oblong au-dessous des jeunes rameaux.

CALICE supérieur, campanulé, persistant, couvert de poils soyeux en-dehors, partagé en son limbe en cinq divisions droites, ovales, obtuses.

COROLLE verte, formée de cinq pétales attachés au calice et alternes avec ses divisions; chaque pétale, de forme ovale, légèrement concave intérieurement et obtus au sommet, de même longueur que le calice, ou à-peu-près.

ÉTAMINES, nombreuses, attachées au calice, droites et très-longues;

filets d'un rouge vif, très-rarement réunis, d'une manière inégale, à leur base; anthères ovales, fixées par le milieu; poussière jaune.

PISTIL: ovaire demi-infère, sphérique, glabre dans sa moitié inférieure; couvert dans sa moitié supérieure de poils blancs, doux au toucher, très-courts, très-serrés les uns contre les autres; style droit, de même couleur et de même longueur que les étamines; stygmate légèrement charnu.

FRUIT: capsule sphérique, située au fond du calice, persistant et devenu très-charnu, s'ouvrant par le sommet et divisé intérieurement en trois loges; graines linéaires très-nombreuses, fixées au réceptacle qui forme le centre du fruit.

---

#### OBSERVATIONS.

Le *Metrosideros* que je viens de décrire est nouveau. Cette plante a été obtenue de graines apportées par le capitaine Baudin; elle a fleuri pour la première fois à Malmaison pendant le mois d'août de 1811.

Le *Metrosideros glauca* est, sans contredit, la plus belle espèce de ce genre et de tous les autres voisins; il mérite de fixer l'attention des cultivateurs et des amateurs par la beauté et par l'éclat de ses fleurs, qui sont beaucoup plus belles que celles du *Metrosideros lophanta*<sup>1</sup>, très-répandu dans nos jardins. Cette nouvelle espèce est encore rare; mais elle deviendra bientôt très-commune, parceque les deux forts pieds de cette plante qui sont à Malmaison commencent à porter des fruits.

Le *Metrosideros glauca* exige la même culture que les autres espèces de ce genre, et pourroit être cultivé en pleine terre dans le midi de l'empire.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXIV.

FIG. 1. Une fleur ouverte pour faire voir l'insertion et la disposition des étamines. 2. Un jeune fruit indiquant la forme des divisions du calice. 3. Un pétale. 4. Un faisceau d'étamines.

---

<sup>1</sup> Venteast. Jard. de Celse. tab. 69, *Metrosideros lanceolata*, Smith, *Metrosideros cetrina*, Curt. Bot. Magaz. tab. 260.

# CHORIZEMA.

ORDO NATURALIS, LEGUMINOSÆ. *Juss.*

DECANDRIA MONOGYNIA. *LINN.*

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. *LABILL.*, New. Holl. plantar. specimen. pag. 120.

## SPECIES.

### CHORIZEMA ILICIFOLIA.

CHORIZEMA : foliis alternis, ovali-oblongis, spinoso-dentatis, subtus ramisque pilosiusculis;  
racemis axillaribus, paucifloris.

---

Habitat in Nova Hollandia.

---

PLANTE ligneuse, haute d'un pied (5 décimètres), rameuse et garnie de feuilles dès sa base, parsemée sur presque toutes ses parties de poils blancs et mous.

RAMEAUX alternes, filiformes, couverts d'une écorce mince, de couleur verte.

FEUILLES alternes, glabres et luisantes en-dessus, parsemées de poils en-dessous, coriaces, longues d'un pouce (2 centimètres), sur six ou huit lignes de largeur (2 décimètres), légèrement et inégalement ondulées sur les bords, profondément dentées, et ayant chaque dent terminée par un piquant.

PÉTIOLE très-court, cylindrique.

STIPULES: deux, aiguës et opposées près la base des pétioles.

GRAPPES axillaires un peu plus longues que les feuilles, composées d'un petit nombre de fleurs, de couleur rouge et orangée.

PÉDICELLE très-grêle, muni de deux petites stipules.

CALICE campanulé, persistant, partagé à son limbe en deux lèvres dont la supérieure est formée de deux divisions, et l'inférieure de trois.

COROLLE papilionacée; étendard réfléchi, de couleur orangée, plus large que long, échancré au sommet et supporté par un onglet court; ailes oblongues, de couleur rouge, obtuses, droites, appliquées l'une contre l'autre, onguiculées; carène plus courte que les ailes et de même couleur qu'elles, renfermant les étamines, et composée de deux pétales réunis par leur bord postérieur.

ÉTAMINES: dix, distinctes; filets droits; anthères sphériques, très-petites, de couleur jaune.

PISTIL: ovaire comprimé; style court, arqué; stygmate aigu.

FRUIT: gousse gonflée, renfermant plusieurs graines réniformes et supportées par de petits pédicelles.

#### OBSERVATIONS.

Le genre *Chorizema* a été établi par M. Labillardière<sup>1</sup>. Il est encore peu nombreux en espèces; je n'en ai vu qu'une seule, quoique quelques auteurs en décrivent trois. Le *Chorizema nana*, figuré par Andrews, à la planche 434 du Botanist Repository, ne me paroît être autre chose que le *Chorizema ilicifolia*, vu dans la première année de sa végétation: cette opinion est fondée sur ce que j'ai vu dans des semis de graines du *Chorizema ilicifolia*, faits en 1811. La première année, ces graines ont produit des plantes très-petites; et ce n'est que l'année suivante qu'elles ont acquis un grand développement dans toutes leurs parties et porté des fruits.

Le *Chorizema ilicifolia* demande à être cultivé dans l'orangerie; c'est une plante très-jolie, très-agréable; mais elle exige une culture extrêmement soignée.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXV.

FIG. 1. Corolle étalée pour montrer la forme des pétales. 2. Les étamines. 3. Le pistil. 4. Un fruit de grandeur naturelle. 5. Id. Ouvert, montrant l'insertion et la forme des graines.

<sup>1</sup> Labill. Voyage à la Recher. de la Peyrouse, tom. I, p. 405, tab. 21. — Nov. Holl. plantar. specimen. tom. II, p. 120.

## CACTUS AMBIGUUS.

Cactus: erectus, longus, subdecem angularis: angulis obtusis, spinis setaceis, lana longioribus; petalis integerrimis.

---

Habitat: Patria ignota.

---

PLANTE ligneuse, charnue, droite, non articulée et peu ramifiée, longue de trois à six pieds (1 à 2 mètres) sur un pouce et demi à deux pouces de diamètre (5 centimètres), de couleur verte, creusée dans sa longueur de douze sillons ou à-peu-près, séparés les uns des autres par autant de côtes obtuses, peu saillantes et parallèles entre elles; chaque côte est pourvue de faisceaux formés de huit ou dix aiguillons très-grêles, longs de six ou huit lignes (1 centimètre), de couleur roussâtre, divergens et entourés, à leur base, de poils blancs, très-courts et très-serrés.

RAMEAUX alternes, peu nombreux, peu ouverts, naissant sur les angles de la tige principale, terminés au sommet par un faisceau d'aiguillons très-rapprochés.

FLEUILLES: il n'y en a pas.

FLEURS solitaires, situées sur les angles de la tige ou des rameaux, longues de huit ou dix pouces (2 décimètres) et d'un beau blanc.

CALICE supère, charnu, cylindrique, renflé à sa base, composé d'un grand nombre de folioles plus ou moins colorées, réunies inférieurement et dont les intérieures sont beaucoup plus grandes; les extérieures, beaucoup plus courtes, sont à peine libres à leur sommet et comme renflées, et portent un faisceau d'aiguillons qui ont moins de consistance que ceux de la tige.

COROLLE composée d'un très-grand nombre de pétales blancs, entiers, et dont les intérieurs sont un peu plus larges que les extérieurs.

ETAMINES très-nombreuses, attachées au calice, droites et disposées



## CACTUS AMBIGUUS.

91

en cercle; filets blancs, très-déliés; anthères d'une belle couleur jaune, fixées par le milieu et formées de deux loges.

PISTIL: ovaire infère; style blanc, droit, charnu, terminé par dix ou douze divisions.

FRUIT: non observé.

---

### OBSERVATIONS.

Le *Cactus* que je viens de décrire existe depuis long-temps dans nos jardins; mais, comme il n'y avoit jamais fleuri, nous ignorions à quelle espèce il falloit le rapporter. Dans le mois de juin 1811, un pied de cette plante que j'avois fait placer, pendant l'hiver précédent, près du vitrage d'une petite serre chaude bien exposée, a donné des fleurs, et je me suis empressé d'en faire faire le dessin dont on voit la gravure à la planche XXXVI.

Cette nouvelle espèce de *Cactus*, que je désigne sous le nom de *Cactus ambiguus*, se rapproche beaucoup du *Cactus repandus*<sup>1</sup> et du *Cactus serpentinus*<sup>2</sup>. Peut-être rapporterois-je ces trois espèces à une seule, si j'avois pu les observer toutes, vivantes et garnies de fleurs.

D'après la gravure que nous avons du *Cactus repandus* et la description que nous a laissée Cavanilles du *Cactus serpentinus*, ces deux plantes diffèrent du *Cactus ambiguus*, savoir: la première par le tube du calice qui se trouve garni d'écaillés sans aiguillons, et par les pétales intérieurs, qui sont élargis vers leur sommet, terminés en une pointe aiguë et dentés en scie sur les bords; la seconde, par ses tiges rampantes et les pétales intérieurs divisés au sommet en deux parties.

Les espèces de *Cactus* décrites dans les auteurs sont encore peu nombreuses, en comparaison de celles qui existent réellement. Ces plantes étant difficiles à trouver en fleur à cueillir et à sécher, ont été négligées par presque tous les voyageurs. Humboldt et moi avons trouvé et décrit en Amérique un grand nombre d'espèces nouvelles de ce genre, dont une est figurée à la planche III<sup>e</sup> de cet ouvrage, et les autres seront décrites dans notre Flore. Ces plantes offrent de grands avantages aux habitans de l'Afrique et de l'Amérique: plusieurs espèces parmi celles qui sont formées de pièces articulées et comprimées donnent d'excellens fruits; c'est aussi sur des espèces de cette division que vit et se multiplie l'insecte si précieux qui donne la cochenille: plusieurs espèces de celles qui

---

<sup>1</sup> Trew. tab. 14.

<sup>2</sup> Ann. des Sciences nat. vol. IV, pag. 261.

croissent droit et qui ont mérité à ces plantes le nom de cierges fournissent aux habitants des bois utiles. Nous avons vu tous les Indiens du golfe de Cariaco et les marins de la côte de Paria se servir exclusivement du bois de *Cactus* pour se faire des avirons; enfin toutes les espèces de ce genre sont recherchées par plusieurs animaux, qui font leur nourriture des jeunes pousses et des autres parties tendres de ces végétaux.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXVI.

*Une branche du Cactus ambiguus garnie de fleurs dans divers états de développement.*

# COTYLEDON.

ORDO NATURALIS, SEMPERVIVÆ. JUSS.

DECANDRIA PENTAGYNIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. JUSS. Gen. plant. pag. 207.

## SPECIES.

### COTYLEDON TARDIFLORUM.

---

Habitat : Patria ignota.

---

PLANTE grasse, ligneuse, haute de trois à quatre pieds (1 mètre), glabre sur toutes ses parties; tronc cylindrique, de deux pouces de diamètre (5 centimètres), divisé au sommet en plusieurs branches recouvertes d'un épiderme grisâtre qui se lève par écailles, nues inférieurement, garnies de feuilles à leur sommet et marquées de cicatrices formées par la chute des feuilles.

FEUILLES charnues, ouvertes, recourbées, rassemblées au sommet des jeunes rameaux, longues de deux à quatre pouces (1 décimètre), sur un pouce ou un pouce et demi (3 centimètres) de largeur, arrondies sur les bords. Les jeunes feuilles, au moment de leur développement, sont convexes en-dessus et très-obtuses; dans un âge plus avancé, elles deviennent pliées sur leur longueur en forme de gouttière, elles s'allongent et deviennent aiguës à leurs extrémités.

PÉTIOLE très-court, aplati intérieurement, convexe en-dehors.

GRAPPE terminale, lâche, ouverte, garnie d'un petit nombre de fleurs rougeâtres, pendantes et supportées par des pédicelles courts.

CALICE infère, trois ou quatre fois plus petit que la corolle, charnu, campanulé, de couleur verte, partagé en cinq divisions droites et presque égales entre elles.

COROLLE d'une seule pièce, longue de huit ou dix lignes (2 centimètres); tube droit, légèrement pentagone et évasé au sommet; limbe divisé en cinq parties presque aussi longues que le tube, ouvertes et recourbées en-dessous.

ÉTAMINES: dix, attachées au bas du tube de la corolle: filets blancs, droits, garnis de poils au lieu de leur insertion, amincis et diversement recourbés au sommet: anthères réniformes, d'un beau violet.

PISTIL: cinq ovaires réunis en un seul corps, et terminés chacun par un style simple: stigmates aigus, d'une belle couleur rose.

NECTAIRE: cinq écailles disposées autour des ovaires, échancrées à leur sommet.

FRUIT: non observé.

#### OBSERVATIONS.

La nouvelle espèce de *Cotyledon* que je viens de décrire, et à laquelle j'ai donné le nom de *Cotyledon tardiflorum*, existe depuis très-long-temps dans nos serres; mais, comme elle n'avoit jamais donné de fleurs, il avoit été impossible de lui assigner un nom. On croyoit généralement qu'elle appartenoit au genre *sedum*.

C'est en août 1812 que j'ai pu obtenir des fleurs de cette plante, et je ne le dois qu'à l'exposition que je lui ai donnée pendant l'hiver dans une serre construite pour soigner les plantes grasses.

Le *Cotyledon tardiflorum* est encore rare dans nos jardins: il s'élève à trois ou quatre pieds de haut, et mérite l'attention des cultivateurs par la beauté de ses fleurs et par celle de son feuillage, qui varie en forme et en couleur à diverses époques de la végétation.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXVII.

FIG. 1. Une corolle fendue selon sa longueur, et étalée pour montrer l'insertion et la disposition des étamines. 2. Étamine détachée de la corolle, et grossie. 3. Pistil.

## ERICA VERSICOLOR.

ERICA : foliis ternis, linearibus, patenti-reflexis : floribus cernuis, ad summitatem ramulorum ternatis, pedicellatis ; corollis tubulosis, supernè paululum ventricosis, laciniis lato-ovalibus, erectis ; staminibus inclusis ; antheris muticis.

---

Habitat ad Caput Bonæ Spei.

---

PLANTE ligneuse, haute de deux ou trois pieds (9 décimètres), glabre sur toutes ses parties, rameuse dès le collet de sa racine, couverte d'une écorce grisâtre.

RAMEAUX ternés, feuillus, droits ou étalés, portant des fleurs à leur sommet.

FEUILLES ternées, rapprochées les unes des autres, ouvertes ou réflé- chies, linéaires; convexes en-dessus et d'un vert luisant ; plus pâles en-dessous, et marquées d'un sillon longitudinal.

FLEURS en tube, de couleur rouge et verte, disposées trois par trois, à l'extrémité des jeunes rameaux, penchées, supportées par des pédicelles allongés.

PÉDICELLES grêles, munis à leur sommet de trois petites bractées ovales, de couleur verte.

CALICE : quatre folioles ovales, aiguës, de même couleur que les bractées.

COROLLE en forme de tube, droite, cylindrique, de couleur rouge, verte à son limbe seulement, légèrement rétrécie un peu au-dessus de sa base, ventrue vers sa partie moyenne et rétrécie à sa gorge : limbe partagé en quatre divisions, ovales, obtuses, droites.

ÉTAMINES : huit, de même longueur que la corolle, attachées à la cir- conférence d'un disque hypogyne : filets blancs, grêles, droits, arqués intérieurement vers leur sommet : anthères de couleur

orange, formées de deux loges réunies par leur base seulement, et percées en-dehors d'une petite fente.

**PISTIL**: ovaire-supère, placé sur un disque hypogyne, comme formé de quatre lobes, plus large au sommet qu'à sa base; glabre, d'un vert luisant; style droit, stigmaté légèrement charnu.

**FRUIT**: capsule ovale, déprimée, divisée intérieurement en quatre loges qui renferment un grand nombre de graines.

#### OBSERVATIONS.

L'*Erica versicolor* dont je donne la figure à la planche XXXVIII, nous a été envoyée d'Angleterre vers la fin de 1811. En mars 1813, cette plante étoit garnie de fleurs dans les serres de Navarre, et je me suis déterminé à la faire dessiner, à cause des différences que je lui ai trouvées avec la description qu'en donne Willdenow<sup>1</sup>, et avec la figure qui est dans l'édition in-8° de l'ouvrage d'Andrews sur les bruyères. Cette plante avoit acquis un degré de développement parfait, ses feuilles étoient entièrement glabres, et nullement ciliées, comme l'indique Willdenow. Les fleurs, d'un rouge plus ou moins vif, n'offroient pas de couleur orangée à leur base; le limbe seul étoit d'un vert bien prononcé.

Andrews, dans le même ouvrage, a figuré sous le nom d'*Erica versicolor longiflora*, une plante qui se rapproche assez de celle dont je donne ici la figure et la description, par ses feuilles glabres et la couleur de ses corolles, qui sont seulement rouges et vertes. Je crois qu'il est nécessaire, pour décider si ces plantes forment des espèces distinctes ou sont des variétés les unes des autres, de les voir toutes en fleurs et en différens états de végétation. Le grand nombre des espèces de ce genre, le peu de figures exactes que nous en avons, et le manque de collections vivantes, offrent de grands obstacles à la détermination précise des espèces.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXVIII.

FIG. 1. Une portion de rameau, indiquant la disposition des feuilles. 2. Une feuille vue en-dessous. 3. Une corolle fendue selon sa longueur, et étalée, pour montrer la manière dont elle est divisée à son limbe, et la forme de ses divisions. 4. Un calice muni de son pédicelle et des bractées qui l'accompagnent. 5. Une fleur dont on a enlevé le calice et la corolle, pour montrer la disposition des étamines et leur rapport avec le pistil. 6. Une étamine. 7. Pistil.

<sup>1</sup> W. Sp. pl. tom. II, p. 397.

## LOBELIA SURINAMENSIS.

*LOBELIA : erecta, graminascula : caule suffruticoso : foliis lanceolatis, sub serrato-denticulatis : floribus magnis, ad summitatem ramulorum axillaribus, sub corymbosis : pedunculis florum longitudine, inferne bibracteatis. Calycis laciniae lineari-lanceolatis, denticulatis, patentibus.*

---

Habitat in Surinamo et in Guyana.

---

PLANTE laiteuse, vivace, sous-ligneuse, haute de six à huit pieds (2 mètres); tiges et rameaux cylindriques, glabres ou parsemés de petits poils courts, éloignés les uns des autres et à peine visibles à l'œil nu.

FEUILLES alternes, membraneuses, longues de cinq à six pouces (1 décimètre) sur un pouce ou un pouce et demi de largeur (3 centimètres), légèrement et inégalement dentées sur les bords, arrondies à leur base, aiguës au sommet; d'un vert brillant en-dessus, plus pâles en-dessous, et marquées de veines saillantes.

PÉTIOLLES longs d'un demi-pouce (1 centimètre), convexes en-dehors, creusés en gouttière intérieurement.

FLEURS grandes, d'un rouge vif, placées une à une dans les aisselles des feuilles, pédonculées, et comme disposées en corymbe à l'extrémité des jeunes rameaux.

PÉDONCULES grêles, de même longueur que les fleurs, munis à leur base de deux bractées linéaires.

CALICE campanulé, glabre, d'un vert luisant, marqué à sa base de dix petites bosses ou tubercules plus ou moins élevés; partagé à son limbe en cinq divisions longues, étroites, aiguës, et inégalement denticulées sur les bords.

COROLLE tubulée, longue d'un pouce et demi à deux pouces (5 centimètres), glabre, manifestement comprimée dans sa moitié supérieure, comme quadrangulaire dans l'inférieure, et marquée au-dessus de sa base de quatre enfoncements; limbe divisé en deux lèvres, dont la supérieure est aiguë, et l'inférieure partagée en trois dents rapprochées les unes des autres.

ÉTAMINES: cinq, insérées à la base de la corolle; filets blancs, distincts à leur base seulement, réunis dans le reste de leur longueur en un tube cylindrique; anthères exsertes, réunies et garnies de longs poils de couleur violette.

PISTIL: ovaire-infère; style de même longueur que les étamines; stigmate bilamellé, entouré à sa base d'un anneau de poils qui embrasse ses divisions, et qui s'en détache lors de l'émission du pollen.

FRUIT: non observé.

---

#### OBSERVATIONS.

Le *Lobelia* que je viens de décrire se trouve déjà publié sous le nom de *Lobelia laevigata* et sous celui de *surinamensis*<sup>1</sup>. M. de Jussieu a cette plante en herbier, cueillie au Pérou, sous le nom de *Lobelia sphaericarpa*. Je conserve à cette espèce le nom de *Lobelia surinamensis*, sous lequel elle est généralement connue aujourd'hui, et j'en donne une bonne figure qui servira à la faire reconnoître et distinguer des autres plantes de ce genre, avec lesquelles elle a de l'affinité. Le *Lobelia surinamensis* est une plante magnifique, très-propre à l'ornement de nos serres chaudes. Elle a fleuri pour la première fois dans celles de Malmaison, en mars 1813, et je l'ai fait multiplier abondamment pour la répandre dans tous les établissemens où elle ne se trouvoit pas. La végétation de cette Lobélie est si forte, qu'on pourroit en disposer les pieds de manière à avoir des fleurs pendant presque toute l'année, comme on a des violettes et des fraises.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXIX.

Fig. 1. Une branche de *Lobelia surinamensis*.

---

<sup>1</sup> Wild. Sp. pl. tom. I, p. 946.



## ACACIA CURVIFOLIA.

ACACIA : inermis, foliis duplicato-pinnatis; pinnulis sub quindecimjagis, foliolis numerosissimis, minutis, glaberrimis; spicis axillaribus geminatis.

---

Habitat: Patria ignota.

---

PLANTE ligneuse, haute de trois pieds (9 décimètres), d'un port très-élégant, garnie de feuilles doublement pinnées, courbées en manière d'arc, composées de folioles très-nombreuses et très-petites.

TRONC droit, de la grosseur du petit doigt, se divisant en plusieurs branches près du collet de la racine; couvert d'une écorce grisâtre, légèrement gercée.

FEUILLES alternes, doublement pinnées, longues de cinq à six pouces (1 décimètre), composées de douze ou de dix-huit paires de pinnules opposées, longues d'un pouce ou d'un pouce et demi (3 centimètres), folioles nombreuses, petites, linéaires, plus grandes d'un côté que de l'autre, sessiles.

PÉTIOLÉS communs, renflés à leur base, convexes en-dehors, sillonnés intérieurement, et pourvus d'une glande sessile entre la première paire de pinnules.

FLEURS : épis oblongs, cylindriques, de couleur jaune, disposés deux à deux dans les aisselles des feuilles.

CALICE ovale, d'un jaune verdâtre, partagé à son limbe en cinq petites dents inégales, droites.

COROLLE de couleur jaune, trois fois plus grande que le calice, formée de cinq pétales oblongs, aigus au sommet, tronqués et rétrécis à leur base.

ÉTAMINES : dix, dont cinq plus courtes; filets blancs, droits; anthères ovales, biloculaires.

PISTIL : ovaire-supère, parsemé de poils à son sommet; style droit; stigmate simple.

FRUIT : non observé.

---

#### OBSERVATIONS.

La nouvelle espèce d'*Acacia* que je viens de décrire a été obtenue de semis faits à Malmaison en 1806. Les recherches que j'ai faites pour connoître le pays natal de cette plante me portent à croire qu'elle est originaire du Mexique, et que ses graines faisoient partie de la riche collection que M. de Humboldt et moi avons apportée. Cette plante n'existe que dans les serres de Malmaison, et il n'y en a qu'un individu. Ce n'est qu'avec une peine extrême que j'ai pu parvenir à la conserver et à en obtenir des fleurs. Comme tous les grands arbres des pays chauds et d'un bois dur, elle n'offre dans nos serres qu'une végétation languissante.

L'*Acacia curvifolia*, quoique petit, est d'un port agréable, par la légèreté et l'élégance de son feuillage; ses fleurs, très-petites, sont en épis cylindriques, longs d'un pouce (2 centimètres), droits et disposés deux à deux dans les aisselles des feuilles. C'est en août 1811 que cette plante a fleuri pour la première fois dans les serres de Malmaison; et, quoique depuis cette époque elle ait constamment porté des fleurs tous les ans, elle n'a pas produit de fruits.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XL.

FIG. 1. Une fleur entière, de grandeur naturelle. 2. Idem grossie. 3. Un pétal. 4. Pistil.

## METROSIDEROS PALLIDA.

METROSIDEROS: foliis alternis obovati-oblongis, glaucis, mucronatis; floribus infra ramulos  
spicatum congestis.

---

Habitat in nova Hollandia.

---

PLANTE ligneuse, haute de quatre ou six pieds (3 mètres); tronc droit d'un pouce et demi à deux pouces (5 centimètres) de diamètre, couvert d'une écorce grisâtre peu épaisse et gercée inégalement.

rameaux alternes, droits ou légèrement ouverts, cylindriques et parsemés de petits tubercules dont la plupart sont produits par la chute des feuilles; l'écorce qui les recouvre est glabre et d'une couleur très-variée.

FEUILLES alternes, de couleur glauque, rapprochées à l'extrémité des jeunes rameaux, droites, ponctuées, marquées de trois nervures dont les latérales sont à peine visibles et distinctes du bord; coriaces, longues de deux pouces (5 centimètres) sur cinq à six lignes (1 centimètre) de largeur; un peu plus larges au sommet qu'à la base, et terminées par un aiguillon: les jeunes feuilles sont d'une belle couleur rose et velues avant leur entier développement.

PÉTIOLE très-court, aplati intérieurement, charnu et renflé en-dehors.

FLEURS d'un vert très-pâle, disposées en épis au-dessous du sommet des jeunes rameaux.

CALICE supère, demi-sphérique, glabre, persistant, partagé à son limbe en cinq divisions ovales, caduques.

COROLLE: cinq pétales d'un vert pâle, attachés au calice et alternes avec ses divisions.

ÉTAMINES, nombreuses, attachées au calice, droites, très-longues; filets verdâtres, libres dans toute leur longueur; anthères ovales, fixées par le milieu; poussière jaune.

## METROSIDEROS PALLIDA.

PISTIL : ovaire demi-infère, pubescent ; style droit, de même couleur et de même longueur que les étamines ; stigmatte obtus.

FRUIT : capsule sphérique, de la grosseur d'un très-petit pois, recouverte par le calice persistant et devenu charnu, divisée intérieurement en trois loges qui renferment un grand nombre de graines attachées à un réceptacle central.

## OBSERVATIONS.

La nouvelle espèce de *Metrosideros* que je viens de décrire est originaire de la Nouvelle-Hollande, d'où les graines en ont été apportées par l'expédition du capitaine Baudin : je n'ai encore vu cette plante vivante qu'à Malmaison, où il y en a un seul pied, qui a fleuri pour la première fois pendant le mois de mai 1813. Je lui ai donné le nom de *Metrosideros pallida*, parceque ses feuilles et ses fleurs sont d'une couleur pâle.

J'ai vu dernièrement, dans la riche collection de R. Brown, une nouvelle espèce de *Metrosideros* à laquelle il a donné le nom d'*Australis*, mais qu'il n'a pas encore publiée. Il est possible que cette plante, trouvée par M. Brown, soit la même que celle dont je donne ici la description, et que les légères différences que j'y ai observées tiennent à ce que l'échantillon du botaniste anglois a été cueilli à la Nouvelle-Hollande, tandis que l'individu que j'ai décrit a été observé en France dans les serres où on le cultive depuis plusieurs années.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE LXI.

FIG. 1. Une branche du *Metrosideros pallida*.

## MAGNOLIA GLAUCA.

*MAGNOLIA: foliis ellipticis, obtusis, subtus glaucis, pilosiusculis; petalis obovalibus.*

---

Habitat in Virginia, Pensylvania, Carolina.

---

ARBRISSEAU haut de six à douze pieds (4 mètres), quelquefois rameux dès sa base, peu touffu; tronc cylindrique, de deux à trois pouces de diamètre (8 centimètres), recouvert d'une écorce grisâtre, presque lisse.

RAMEAUX alternes, ouverts, souvent tortueux, cylindriques, nus inférieurement, feuillus à leur sommet.

FEUILLES alternes, pétiolées, rapprochées les unes des autres à l'extrémité des jeunes rameaux, longues de trois à cinq pouces (3 décimètres) sur un ou deux (5 centimètres) de largeur, obtuses ou légèrement aiguës à la base et au sommet, glabres et d'un beau vert en-dessus, glauques en-dessous et parsemées de poils blancs très-visibles dans les jeunes feuilles.

PÉTIOLLES longs d'environ un pouce (2 centimètres); cylindriques, glabres, légèrement charnus inférieurement.

FLEURS terminales, d'un beau blanc, quelquefois jaunâtre; d'une odeur douce et agréable; solitaires, portées sur un pédoncule court, et renfermées avant leur développement dans une bractée ovale, caduque, verte et glabre en-dedans, et garnie extérieurement de poils soyeux.

CALICE composé de trois folioles ovales, obtuses, de même couleur que les pétales, qui tombent peu de temps après l'épanouissement de la fleur.

COROLLE ouverte, de deux à trois pouces (8 centimètres) de diamètre, formée de huit ou neuf pétales de forme ovale, obtus, longs d'un pouce, charnus, concaves intérieurement.

ÉTAMINES nombreuses, attachées au bas de l'axe central qui supporte les ovaires; filets blancs très-courts, aplatis et terminés en pointe;

anthères oblongues, implantées au-dessous de la base, et dans les bords amincis des filets.

PISTIL : ovaires nombreux, situés sur un axe central, terminés par un style très-court; stigmates charnus.

FRUIT : cône ové, long d'un à deux pouces (5 centimètres), composé d'un très-grand nombre de petites capsules bivalves, fixées à un axe central, et renfermant chacune une graine de couleur rouge.

#### OBSERVATIONS.

M. Michaux, dans le troisième volume de son ouvrage sur les arbres forestiers de l'Amérique septentrionale, a donné une figure réduite et la description du *Magnolia glauca* : avant cet auteur, Catesby et quelques autres botanistes avoient fait connoître cette plante; cependant je n'hésite pas d'en offrir une figure et une description nouvelles, parcequ'elle doit fixer plus particulièrement qu'elle ne l'a fait jusqu'ici l'attention des cultivateurs. La figure que je donne du *Magnolia glauca*, à la planche XLII de cet ouvrage, est de grandeur naturelle, et représente très-fidèlement la plante dans toutes ses parties.

Le *Magnolia glauca* est originaire de l'Amérique septentrionale; on le trouve en Virginie, dans la Caroline, et en Pensylvanie : il aime les lieux chauds et humides; et, suivant M. Michaux, il s'élève quelquefois jusqu'à quarante pieds (14 mètres), et porte douze ou quatorze pouces de diamètre.

Je cultive à Malmaison et à Navarre un très-grand nombre de *Magnolia glauca* : mais les plus élevés ont à peine douze pieds (4 mètres), et ils semblent être arrivés au terme de leur végétation. Un climat plus méridional convient sans doute mieux à l'élévation du *Magnolia glauca*. Cependant je crois que si on se décidait à cultiver en grand cette plante pour tirer parti de ses fleurs, il seroit bon de l'arrêter à six ou huit pieds (2 mètres) de hauteur, et de faire en sorte que chaque pied fût divisé en deux ou trois branches près du collet de ses racines.

En 1786, M. le professeur Richard, parcourant les Antilles, à son retour de Cayenne, s'assura, étant à la Martinique, que la célèbre madame Amphou employoit les fleurs du *Magnolia plumieri* \* dans la fabrication de ses liqueurs, et il est présumable que l'onctuosité des liqueurs de la Martinique, si supérieure à celle des liqueurs des autres pays, est due à l'emploi de ces fleurs. Quoique le *Magnolia plumieri* doive être séparé du genre *Magnolia* et en for-

\* W. Sp. pl. t. II, p. 1256.

\* Ibid.

mer un nouveau, ainsi que l'a très-bien observé M. de Jussieu<sup>1</sup>, les fleurs de ces deux plantes exhalent une odeur semblable et délicieuse, et contiennent une grande quantité d'huile essentielle. Il est évident, d'après cela, que nos liquoristes devroient employer les fleurs du *Magnolia glauca* dans la fabrication des liqueurs, puisque nous pouvons cultiver cette plante en plein air sous le climat de Paris, et mieux encore dans les départemens méridionaux de la France.

J'ai déjà réuni plus de deux cents pieds de *Magnolia glauca*, et je me propose d'en augmenter encore le nombre. Je cultiverai en grand cette plante précieuse, convaincu, par les expériences que j'ai fait faire en 1812, que les liqueurs dans lesquelles on fera entrer ses fleurs auront un degré de supériorité incontestable sur toutes celles que l'on a faites en France jusqu'à ce jour.

Le *Magnolia glauca* donne des fruits mûrs dans le climat de Paris; il est d'ailleurs très facile d'en faire venir des Etats-Unis; et, dans le cas où quelques cultivateurs ne pourroient pas se les procurer en France, il leur sera facile de le multiplier par le moyen des marcottes, qui réussissent sur ce *Magnolia* aussi bien que sur toutes les autres espèces du même genre.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE LXII.

Un rameau du *Magnolia glauca*

---

<sup>1</sup> Talauma, Juss. Gen. pl. pag. 281.

## ERICA VESTITA.

ERICA: ramis ramulisque virgatis, foliis octonis, sub setaceo-linearibus, interne pilosiusculis, tremulis; floribus axillaribus, infra ramulorum apicem spicato-aggregatis; corollis cylindraceo-tubulosis, subarcuatis; ovario sulcato, superne pilosiusculo; antheris muticis; foliolis calycinis inferne ovalibus, superne lineari-subulatis, glandulosis.

---

Habitat ad Caput Bonæ Spei.

---

PLANTE ligneuse, haute de trois à six pieds (1 à deux mètres), presque entièrement glabre, recouverte d'une écorce grisâtre lisse ou parsemée de petites cicatrices résultant de la chute des feuilles.

RAMEAUX verticillés, droits, rassemblés en faisceau, nus inférieurement, feuillus à leur sommet.

FEUILLES longues de 8 à 10 lignes (2 centimètres), cylindriques, verticillées huit par huit, tremblantes, parsemées de poils courts intérieurement.

PÉTIOLÉS cylindriques, longs d'une ligne (2 centièmes de millimètre.)

FLEURS en tube, d'un rouge brillant, disposées une à une dans les aisselles des feuilles, pédicellées et comme rassemblées en épi un peu au-dessous du sommet des rameaux.

PÉDICELLE alongé, portant une seule fleur, muni de trois petites bractées, dont une vers le milieu du pédicelle, deux autres opposées à son sommet.

CALICE infère, formé de quatre folioles glabres, ovales dans leur moitié inférieure, linéaires et aiguës dans la supérieure; marquées en-dehors d'un sillon longitudinal, et garnies de petits points glanduleux sur les bords.

COROLLE tubulée, cylindrique, légèrement arquée, longue d'un pouce (2 centimètres), entièrement glabre, partagée à son limbe en quatre divisions ovales, obtuses, déprimées et un peu ouvertes.



# ERICA VESTITA.

107

ETAMINES: huit, de même longueur, ou à-peu-près, que la corolle; attachées autour d'un disque hypogyne, et alternes avec de petits corps glanduleux, verdâtres; filets cylindriques, droits et blancs dans leur moitié inférieure, arqués en-dedans et de couleur rose dans leur moitié supérieure; anthères jaunes, formées de deux loges réunies par leur base et écartées à leur sommet.

PISTIL: ovaire supère, plus étroit à la base qu'àu sommet, marqué dans sa longueur de huit petites côtes saillantes, et garni de poils au sommet; style de couleur rouge, droit, plus long que la corolle; stigmate en forme de tête, déprimé, de couleur violette et comme partagé en quatre lobes.

FRUIT: non observé.

## OBSERVATIONS.

La culture a produit beaucoup de variétés dans le genre *Erica*, et il est très-difficile aujourd'hui de déterminer les espèces de ce genre d'une manière précise, si l'on n'a pas sous les yeux toutes les bruyères vivantes, ou au moins un très-grand nombre d'elles.

La plante que je viens de décrire, et dont je donne la figure à la planche XLIII, a été figurée par M. Andrews, sous le nom d'*Erica vestita coccinea*, et le même auteur a donné huit variétés de cette espèce: j'en possède plusieurs dans la collection de Navarre et de Malmaison, et je crois qu'il sera facile d'en former différentes espèces, lorsque ces plantes auront acquis un degré de végétation parfaite dans toutes leurs parties.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XLIII.

FIG. 1. Une partie de rameau indiquant les feuilles verticillées huit par huit. 2. Une feuille vue de trois quarts, et indiquant les poils dont elle est pourvue à sa face supérieure. 3. Id. vue par derrière. 4. Calice, détaché de la corolle, supporté par son pédicelle. 5. Etamines vues dans leur position naturelle. 6. Une étamine grossie, pour faire voir la forme des anthères. 7. Pistil.

## ERICA PATERSONIA.

ERICA : ramulis floriferis, infra caulis apicem confertis, pyramidatis; foliis quaternis, filiformibus, incurvis; corollis abbreviato-tubulosis, rectis, laciniis obtusis, patentibus; staminibus inclusis, antheris aristatis; foliolis calycinis inferne ovalibus, superne filiformibus.

---

Habitat ad Caput Bonæ Spei.

---

PLANTE ligneuse, de deux à trois pieds (1 mètre) de hauteur, rameuse et feuillue dès sa base; rameaux droits, d'inégale longueur, garnis de ramillets courts, très-feuillus et imitant par leur disposition une pyramide.

FEUILLES quaternées, linéaires, ouvertes et légèrement arquées en dedans, longues de quatre à six lignes (1 centimètre), terminées en pointe, entièrement glabres.

FLEURS tubulées, de couleur jaune, disposées deux par deux ou trois par trois, à l'extrémité des jeunes rameaux, et imitant une pyramide par leur disposition.

PÉDICELLE : uniflore, court, très-grêle, muni de trois bractées linéaires.

CALICE : composé de quatre folioles ovales à leur base, et scarieuses sur les bords; linéaires dans leur partie supérieure.

COROLLE : tubulée, cylindrique, droite, longue de six à huit lignes (22 centimètres), partagée à son limbe, en quatre divisions obtuses, ouvertes et légèrement recourbées en-dehors.

ÉTAMINES : huit, attachées autour d'un disque hypogyne; filets droits, de couleur jaune; anthères incluses terminées inférieurement et en-dehors par deux appendices filiformes.

PISTIL : ovaire sphérique, placé sur un disque charnu, marqué de huit petites côtes saillantes; style droit, un peu plus long que les

## ERICA PATERSONIA.

109

étamines; stigmate petit, en forme de massue, et comme divisé en quatre lobes.

FRUIT: non observé.

---

### OBSERVATIONS.

Il est extrêmement rare de voir l'*Erica patersonia* dans les collections de plantes vivantes. De même que le *Protea argentea*, cette espèce de bruyère et beaucoup d'autres plantes meurent au moment où elles offrent la plus belle végétation.

Andrews a donné la figure de deux bruyères qu'il regarde comme des variétés de l'*Erica patersonia*; l'une, sous le nom de *Patersonia coccinea*; et l'autre, sous celui de *Patersonia major*. Je n'ai pas vu ces deux dernières plantes vivantes; mais, autant qu'il est possible d'en juger par les figures de M. Andrews, je suis porté à les considérer comme deux espèces très-distinctes, et je fonde mon opinion sur les différences que présentent les étamines, les folioles du calice, et enfin leur port.

L'*Erica patersonia* que je viens de décrire, et dont je donne une figure très-exacte à la planche XLIV, est bien certainement l'espèce primitive<sup>1</sup>. Elle fait partie de la collection des plantes de Navarre, où je l'ai fait dessiner en mai 1811.

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XLIV.

Fig. 1. Un rameau de l'*Erica patersonia*, chargé de fleurs.

---

<sup>1</sup> Willd. Sp. pl. tom. II, p. 370.

## ACACIA SUBULATA.

ACACIA : inermis, foliis longo-linearibus, apice subulatis; floribus interrupte spicatis, spicis axillaribus, subsolitariis; ramulis angulato compressis.

---

Habitat in nova Hollandia.

---

PLANTE ligneuse, sans épines; haute de six pieds (2 mètres); tronc droit, de la grosseur du doigt indicateur, couvert d'une écorce lisse, de couleur verte et parsemée de petits tubercules grisâtres; rameaux alternes, droits ou légèrement ouverts; cylindriques inférieurement, inégalement anguleux ou comprimés à leur sommet.

FEUILLES alternes, sessiles, linéaires, longues de quatre pouces (1 décimètre) sur une ligne et demie de largeur au plus (3 centièmes de millimètre), terminées par une pointe aiguë.

FLEURS jaunes, très-petites, disposées par petits groupes sphériques, et formant un épi linéaire, situé dans les aisselles des feuilles.

CALICE campanulé, partagé à son limbe en cinq petites dents droites, égales.

COROLLE deux fois plus grande que le calice, composée de cinq pétales lancéolés, tronqués à leur base, réfléchis.

ÉTAMINES nombreuses, plus grandes que la corolle; filets de couleur jaunâtre, qui paroissent formés de nœuds comme les conferves, lorsqu'on les regarde avec la loupe; anthères ovales.

PISTIL : ovaire ovale, parsemé de poils; terminé par un style droit; stigmate obtus.

FRUIT : non observé.

---

### OBSERVATIONS.

On cultive dans nos jardins trois espèces d'*Acacia* très-distinctes, sous le nom d'*Acacia linifolia*. J'ai donné, à la planche XXV de cet ouvrage, une

## ACACIA SUBULATA.

III

très-bonne figure de cette espèce, déjà représentée par quelques auteurs : j'offre, à la planche XLV, la gravure d'une espèce très-voisine du *Linifolia*, que je désigne sous le nom d'*Acacia subulata*. La troisième espèce de ce genre, confondue avec le *Linifolia*, est facile à distinguer des deux autres par ses feuilles linéaires, arrondies au sommet, terminées par une pointe molle, plus longues que celles de l'*Acacia linifolia*, et plus courtes que celles du *subulata*. J'ai vu cette dernière espèce et l'*Acacia linifolia* dans les jardins d'Angleterre, où elles sont aussi confondues l'une avec l'autre. L'*Acacia subulata* dont je donne ici la figure et la description n'existe, je crois, que dans les jardins de Malmaison et dans l'intéressante collection de M. Boursault<sup>1</sup>, que j'ai déjà eu occasion de recommander aux amateurs de plantes dans cet ouvrage. Ces nouvelles espèces sont probablement originaires de la nouvelle Hollande, et nous les devons à l'expédition du capitaine Baudin qui en a apporté les graines.

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XLV.

FIG. 1. Une fleur entière. 2. Un pétale. 3. Etamines séparées du calice et de la corolle. 4. Une étamine grossie pour faire voir les filets, dont la texture est analogue à celle des conferves. 5. Pistil.

<sup>1</sup> Rue Blanche, n° 20, à Paris.

## LOBELIA EXCELSA.

*LOBELIA* : caule erecto, sub simpliciter; foliis lineari-lanceolatis; spinuloso-denticulatis, inferne, angustatis, subsessilibus; floribus magnis arcuatis; corollae laciniis superne cohaerentibus.

---

Habitat : Patria ignota.

---

PLANTE vivace, laiteuse, haute de huit à dix pieds (3 mètres), glabre sur toutes ses parties; tige droite, cylindrique, de la grosseur du doigt médium; simple, un peu rameuse, feuillue depuis sa base jusqu'au sommet; couverte d'une écorce luisante, de couleur verte.

FEUILLES éparses, rapprochées les unes des autres, droites ou étalées, membraneuses, longues de quatre à six pouces (5 centimètres) ou à-peu-près; étroites inférieurement, larges de quatre ou six lignes (1 centimètre) vers le sommet, marquées sur les bords de petites dents inégales, légèrement cartilagineuses et piquantes.

PÉTIOLÉS très-courts, un peu charnus, convexes en-dehors.

FLEURS tubulées, de couleur rougeâtre, arquées, longues de deux pouces (5 centimètres), disposées une à une dans les aisselles des feuilles, pédicellées et comme rassemblées en épi.

PÉDICELLE cylindrique, long de huit à dix lignes (2 centimètres), uniflore et muni, vers son milieu, de deux bractées opposées, linéaires, droites.

CALICE supère, campanulé, long de six lignes (1 centimètre), légèrement oblique à sa base, partagé jusque vers son milieu en cinq divisions linéaires, droites, aiguës au sommet, écartées les unes des autres à la base.

COROLLE en forme d'arc, comprimée sur les côtés, fendue très-profondément en-dehors, partagée à son limbe en cinq divisions linéaires, toutes réunies par leurs bords.

ÉTAMINES : cinq, attachées à la base de la corolle; filets distincts, inférieurement membraneux, ciliés sur les bords et réunis dans le reste

de leur longueur en un tube cylindrique; anthères droites, linéaires, réunies par leurs bords, et s'ouvrant longitudinalement en-dedans: de ces anthères, trois sont garnies de poils dans leur longueur, et en sont dépourvues au sommet; les deux autres, au contraire, sont terminées par un faisceau de poils très-épais et entièrement glabres en-dehors.

PISTIL: ovaire infère, déprimé, terminé par un style plus long que les étamines; stigmate bilamellé, légèrement charnu et enveloppé par un involucre velu qui tombe avant la maturité du pollen.

FRUIT: non observé.

---

#### OBSERVATIONS.

La nouvelle espèce de *Lobelia* que je viens de décrire m'a été envoyée d'Angleterre en 1812, sous le nom de *Lobelia gigantea*. Mais elle ne se rapporte nullement à l'espèce de ce nom décrite et figurée par Cavanilles<sup>1</sup>. Notre plante a beaucoup plus d'analogie avec une espèce inédite de ce genre que possède M. Richard, et qu'il a apportée de Cayenne.

J'ai donné à cette nouvelle plante le nom de *Lobelia excelsa*, à cause de la grandeur énorme de sa tige, que j'ai vue s'élever, sur le seul pied vivant de cette plante qui existe à Malmaison, à la hauteur de huit ou dix pieds. Le *Lobelia excelsa* ne se trouve dans aucune des riches collections de plantes sèches et vivantes qui sont à Paris. Malmaison seul le possède, et l'a vu fleurir en juin 1813. La force de sa végétation et la beauté de ses fleurs méritent de fixer l'attention des botanistes et des cultivateurs, et leur faire rechercher cette nouvelle espèce pour l'ornement de leurs serres.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XLVI.

FIG. 1. Une fleur dont on a ôté la corolle, pour faire voir la forme et la disposition des étamines.  
2. Pistil. 5. Stigmate vu après la fécondation, et couvert de pollen.

---

<sup>1</sup> Cavanilles, Icones, t. VI, tab. 513.

## PÆONIA ALBIFLORA FLORE PLENO. <sup>1</sup>

*PÆONIA*: caule herbaceo, foliis glaberrimis, nitidis, superioribus simplicibus ternisve, inferioribus biternatis; foliis ovali-lanceolatis; petalis linearibus oblongisve, apice inaequaliter dentatis vel partitis; capsulis recurvatis, pilosis.

---

Habitat in Siberia.

---

**PLANTE** vivace, haute de trois pieds (1 mètre), glabre sur presque toutes ses parties; produisant, du collet de sa racine, plusieurs tiges de la grosseur du petit doigt, cylindriques, et d'un rouge plus ou moins foncé.

**FEUILLES** alternes, longues d'un pied (3 décimètres); biternées, excepté les supérieures, qui sont simples ou ternées; chaque foliole a une forme lancéolée, l'intermédiaire seule est bi ou trilobée; toutes sont d'un vert foncé, luisantes en-dessus, d'un vert pâle en-dessous et marquées de veines très-nombreuses.

**PÉTIOLE** commun, long de deux à trois pouces (7 centimètres), renflé à sa base, creusé en gouttière intérieurement; pétioles partiels plus courts et plus minces que le pétiole commun, légèrement comprimés sur les côtés, convexes en-dehors, creusés intérieurement en gouttière.

**FLEURS** terminales, doubles, d'un blanc de neige, de quatre à cinq pouces (5 centimètres) de diamètre et d'une hauteur égale.

**CALICE** infère, généralement formé de trois folioles orbiculaires, d'inégale grandeur, réfléchies, concaves, échancrées au sommet et souvent munies d'une pointe molle.

**COROLLE** composée d'un grand nombre de pétales longs d'un pouce et demi à deux pouces (5 centimètres) de largeur et de forme inégales; les intérieurs sont, en général, linéaires, entiers, et rarement divisés en deux à leur sommet; les extérieurs, plus larges, sont tantôt oblongs, tantôt cunéiformes, inégalement divisés à leur limbe, et quelquefois teints d'une légère couleur rose.

---

<sup>1</sup> Andr. Botanist repos. tab. 612.



ÉTAMINES très-nombreuses, plus courtes que les pistils, attachées sur un réceptacle légèrement convexe qui entoure les ovaires; filets courts, blancs; anthères jaunes, droites linéaires, comme tournées en spirale, s'ouvrant sur les côtés.

PISTIL: trois ou cinq ovaires, comprimés, d'un rose vif, et recouverts d'un très-grand nombre de poils blancs, doux au toucher; style nul; stigmate alongé, membraneux, de couleur rouge, convexe en-dehors, sillonné en-dedans.

FRUIT: trois ou cinq capsules de même forme et de même couleur que les ovaires, mais plus grosses, uniloculaires, convexes en-dehors, applaties en-dedans, et marquées d'un sillon longitudinal par où elles s'ouvrent. Graines au nombre de six ou huit, fixées aux bords internes des valves sur une seule ligne, ovales, blanches, et comme implantées sur un réceptacle charnu.

#### OBSERVATIONS.

Le *Pæonia albiflora*<sup>1</sup> est originaire de Sibérie. En 1784, il a été porté en Angleterre, où on en cultive plusieurs variétés. Cette plante est encore rare aujourd'hui dans les jardins, et ce n'est qu'en 1811 que j'ai pu me procurer la variété à fleurs doubles dont je donne la figure à la planche XLVII.

M. Boursault, dans un voyage qu'il vient de faire à Londres, s'est procuré un grand nombre de plantes, parmi lesquelles on voit le *Pæonia albiflora* à fleurs simples, la variété à fleurs doubles dont je donne la figure, et deux autres variétés de la même plante, qui manquoient à nos collections.

Le *Pæonia albiflora* à fleurs simples est facile à distinguer de ses variétés: 1° par ses tiges, plus basses et plus feuillues; 2° par ses feuilles, plus courtes, d'un vert plus foncé, ainsi que par ses folioles, plus larges et plus consistantes; 3° par ses fleurs simples; 4° enfin par ses ovaires, qui sont glabres, tandis qu'ils sont constamment couverts de poils dans toutes les variétés.

Le *Pæonia albiflora*, et sur-tout ses variétés, méritent l'attention des cultivateurs, et sont dignes d'occuper le premier rang parmi nos plantes d'agrément. Leurs fleurs, qui contrastent agréablement avec celles de nos pivoines ordinaires, sont d'un blanc de neige pur, ou jaunâtre, ou mêlé de rose.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE XLVII.

Une branche du *Pæonia albiflora*.

<sup>1</sup> Wild. Sp. pl. tom. II, p. 1222.

# BANKSIA.

TETRANDRIA MONOGYNIA. LINN.

ORDO NATURALIS, PROTEACEÆ. JUSS.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. R. BROWN. Prodrum. floræ novæ Hollandiæ, pag. 391.

## SPECIES.

### BANKSIA MARCESCENS.

BANKSIA: foliis subcuneiformibus, planis, sparsis, truncatis; subtus leviter tomentosis, extra medium dentato-serratis, basi acutiusculis; ramulis tomentosis; perianthiis persistentibus folliculisque glabris.

---

Habitat in nova Hollandia.

---

ARBRISSEAU haut de huit à dix pieds (3 mètres), d'un port très-agréable; tronc droit, cylindrique, divisé à trois ou quatre pieds (1 mètre) du collet de sa racine, couvert d'une écorce grisâtre, presque lisse.

rameaux opposés, ouverts, nus inférieurement, feuillus à leur sommet, et couverts d'un duvet tomenteux, peu épais, de couleur roussâtre.

FEUILLES éparses, quelquefois alternes ou opposées, en forme de coin ou à-peu-près, tronquées au sommet, longues d'un pouce et demi à deux pouces (5 centimètres), légèrement coriaces, souvent entières dans leur moitié inférieure, inégalement dentées dans leur moitié supérieure, glabres en-dessus, couvertes en-dessous d'un duvet tomenteux, blanchâtre et un peu épais.

BANKSIA MARCESCENS.

117

PÉTIOLE très-court, convexe en-dehors.

FLEURS jaunes, très-nombreuses, formant par leur réunion un chaton sphérique ou oblong, sessile et attaché sur les rameaux de deux ou trois ans.

CALICE profondément divisé en quatre parties linéaires, droites, recourbées vers le sommet, élargies et légèrement concaves pour recevoir les étamines.

COROLLE: il n'y en a pas.

ÉTAMINES: quatre, attachées au-dessous de la partie concave des divisions du calice; filets très-courts; anthères droites.

PISTIL: ovaire, ovale, pubescent, comme plongé dans un duvet soyeux, roussâtre, droit, très-dense et attaché à l'axe du chaton; style droit, plus long que le calice; stigmate en massue, de forme ovale.

FRUIT: non observé; ovaire divisé intérieurement en deux loges séparées par une cloison membraneuse, et renfermant chacune une graine.

---

OBSERVATIONS.

Les *Protéacées* sont, pour la plupart, originaires de la nouvelle Hollande; on en trouve aussi au Cap de Bonne Espérance et dans les régions tempérées du Pérou et du Chili. Presque toutes les plantes de cet ordre sont des arbrisseaux qui présentent des formes bizarres et dont les fleurs sont, en général, d'une beauté éclatante.

Le voyage d'Entrecasteaux et l'expédition du capitaine Baudin ont enrichi nos serres d'un nombre considérable de ces plantes; mais peu d'elles ont encore acquis assez de force pour nous donner des fleurs avec tout le développement dont elles sont susceptibles. De tous les jardins, celui de Kew est, sans contredit, le plus riche en *Protéacées*. La plupart des espèces de cet ordre y sont aussi belles que dans leur pays natal; elles y portent des fleurs aussi grandes; mais les fruits n'y parviennent jamais au degré de maturité qui est nécessaire pour leur reproduction.

Le *Protea marcescens*, dont je donne la figure à la planche XLVIII, est

encore très-rare dans nos jardins. Malmaison et Navarre possèdent plusieurs pieds de cette belle plante, dont deux sont déjà très-grands. En 1810, ils ont fleuri pour la première fois, et c'est sur un de ces individus que j'ai fait faire le dessin dont j'offre ici la gravure. Depuis cette époque, ils ont fleuri dans leur saison, et chaque année le chaton de leurs fleurs devient plus grand et plus développé.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE XLVIII.

*Fig. 1. Une fleur entière. 2. Un ovaire. 3. Une division du calice avec l'étamine qui est attachée à la base de sa partie intérieure. 4. Id. id. dont l'étamine s'écarte après l'émission de son pollen. 5. Pétal. 6. Les deux ovules, dépourvus de leur enveloppe, et séparés l'une de l'autre par une cloison membraneuse.*

# IXORA.

ORDO NATURALIS, RUBIACEÆ. JUSS.

TETANDRIA MONOGYNIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. JUSS. Gen. plant. p. 203.

## SPECIES.

### IXORA SPECIOSA.

IXORA : foliis brevi petiolatis, oblongis, utrinque acutis; umbellis compositis, terminalibus; laciniis, limbi corollæ ovalibus, obtusis.

---

Habitat in India orientali.

---

PLANTE ligneuse, haute d'un à deux pieds (6 décimètres), généralement divisée dès le collet de sa racine; tiges cylindriques de la grosseur du petit doigt, recouvertes d'une écorce gercée, de couleur très-brune.

RAMEAUX opposés, droits, grêles, d'un rouge plus ou moins vif, feuil-  
lus, entièrement glabres.

FEUILLES opposées, en croix, presque sessiles, d'un vert luisant, légèrement coriaces, très-entières, longues de deux à trois pouces (8 centimètres) sur un pouce et quelques lignes (2 centimètres) de largeur.

STIPULES : deux, opposées, plus larges que longues, réunies par leur bord en manière de gaine, et terminées par une pointe en forme d'aigle, comprimée à sa base en manière de crête et naissant en-  
dehors un peu au-dessous du bord supérieur, qui est très-obtus.

## IXORA SPECIOSA.

FLEURS d'un beau rouge, situées à l'extrémité des jeunes rameaux et formant par leur disposition une ombelle composée.

CALICE supérieur, très-petit, d'un rouge plus vif que les corolles, partagé à son limbe en cinq petites dents droites et obtuses.

COROLLE : hypocratériforme, longue d'un pouce (2 centimètres); tube droit, grêle, cylindrique; limbe ouvert, partagé en quatre divisions arrondies.

ÉTAMINES : quatre, attachées à la gorge de la corolle et alternes avec ses divisions; filets de couleur rouge, presque nuls; anthères ovales, biloculaires, introrses, attachées en-dehors un peu au-dessus de leur base, légèrement bilobées inférieurement, terminées au sommet par une pointe très-fine; poussière jaune.

PISTIL : ovaire infère, sphérique; style filiforme, de même couleur que la corolle et de la longueur de son tube; stigmaté en massue, légèrement fendu au sommet.

FRUIT : non observé.

---

OBSERVATIONS.

Nous cultivons depuis long-temps la plante que je viens de décrire dans tous nos jardins, et elle y est encore généralement connue sous le nom d'*Ixora coccinea*. Curtis, à la planche XXXIX de son *Botanical Magazine*, en a donné une figure sous ce nom, qu'elle conserve dans tous les jardins d'Angleterre que j'ai eu occasion de visiter. Voyant cette belle plante en fleur pour la première fois, en mai 1809, dans les serres de Malmaison, et consultant les divers auteurs<sup>1</sup> qui parlent de l'*Ixora coccinea*, je me suis assuré que l'on confondoit plusieurs espèces différentes sous ce nom. Le professeur Willdenow, quelques années après, fit la même observation, et il a publié depuis cette nouvelle plante sous le nom d'*Ixora speciosa*<sup>2</sup>. Je cultive à Malmaison quatre espèces de ce genre, savoir : l'*Ixora speciosa*, dont je donne ici la description et une figure très-exacte à la planche XLIX; l'*Ixora coccinea*, qui n'a

---

<sup>1</sup> W. Sp. pl. t. I, p. 609.

<sup>2</sup> W. Enum. pl. Horti Berol. t. I, p. 157.

## IXORA SPECIOSA.

121

pas encore acquis un degré de développement parfait; *Ixora alba*<sup>1</sup>, et une nouvelle espèce qui n'a encore été citée dans aucun catalogue.

Les *Ixora* sont tous originaires de pays chauds, et demandent une culture très-soignée. Comme les *Gardenia*, il faut les mettre dans des baches d'une petite dimension, et leur donner beaucoup de chaleur et d'humidité. L'*Ixora speciosa* est une très-belle plante d'ornement qui mérite les soins des cultivateurs. L'*Ixora coccinea* en diffère essentiellement par ses feuilles aiguës au sommet, légèrement échancrées à la base, et par les divisions de ses corolles, qui sont aiguës.

### EXPLICATION DE LA PLANCHE XLIX.

Une branche de l'*Ixora speciosa*.

---

<sup>1</sup> W. Sp. pl. t. I, p. 609.

# ELÆOCARPUS.

ORDO NATURALIS, TILIACEÆ. JUSS. <sup>1</sup>

POLYANDRIA MONOGYNIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. GAERT. de Fruct. et Semin. t. I. p. 202, tab. 43.

## SPECIES.

### ELÆOCARPUS ACUMINATUS.

ELÆOCARPUS: foliis alternis, longiuscule petiolatis, oblongis, æqualiter serratis, subtus reticulato venosis glaberrimis; racemis simplicibus, staminibus villosiusculis.

---

Habitat in nova Hollandia.

---

PLANTE ligneuse, haute de six pieds (2 mètres), entièrement glabre; tige droite, recouverte inférieurement d'une écorce grisâtre; divisée à son sommet en plusieurs branches peu ouvertes, cylindriques, d'un rouge très-foncé, parsemées de tubercules peu sensibles.

FEUILLES alternes, longues de trois ou quatre pouces (1 décimètre) sur un pouce et demi de largeur (4 centimètres), dentées en scie, aiguës et entières inférieurement, acuminées au sommet, glabres et d'un vert brillant en-dessus, plus pâles en-dessous et marquées d'un réseau formé par la saillie des nervures.

PÉTIOLE long de trois à quatre lignes (1 centimètre), sillonné intérieurement, légèrement renflé à la base et au sommet.

STIPULES: deux, opposées, près la base de chaque pétiole, très-petites, de couleur rougeâtre, appliquées sur les rameaux et persistantes.

---

<sup>1</sup> Ann. du Muséum d'Hist. nat. t. II, p. 233.



GRAPPES situées sur les rameaux de deux ou trois ans, garnies d'un petit nombre de fleurs blanches, et réfléchies.

CALICE infère composé de cinq folioles, caduque, d'un blanc terne.

COROLLE un peu plus longue que le calice, composée de cinq pétales blancs, partagés à leur limbe en un grand nombre de divisions.

ÉTAMINES hypogynes, au nombre de trente ou environ, disposées sur deux rangées, beaucoup plus petites que la corolle, velues; filets droits, plus courts que les anthères, terminés par une pointe très-aiguë; anthères adnées, linéaires, de couleur grisâtre.

PISTIL: ovaire supère, glabre, divisé intérieurement en deux loges, entouré à sa base d'un corps charnu de couleur jaune et marqué de dix petits tubercules; style blanc, droit; stigmatte aigu.

FRUIT: droupe ovoïde, longue de six lignes (1 centimètre), renfermant un noyau de même forme marqué extérieurement de rugosités et contenant dans son intérieur deux ou plusieurs graines ovales, droites, attachées par leur extrémité interne et inférieure, et munies d'un embryon droit et cylindrique.

---

#### OBSERVATIONS.

Cette nouvelle espèce d'*Elæocarpus* est originaire de la nouvelle Hollande, d'où elle a été apportée par l'expédition du capitaine Baudin. Malmaison possède un seul pied de cette plante, qui a donné des fleurs pour la première fois pendant le mois de mai 1811.

L'*Elæocarpus acuminatus* diffère essentiellement de l'*Elæocarpus dentatus* et du *serratus*, dont j'ai vu des échantillons dans l'herbier de M. de Jussieu et dans celui du Muséum.

C'est probablement la même plante que je viens de voir figurée à la planche 1737 du *Botanical Magazine*, sous le nom d'*Elæocarpus cyaneus*.

M. de Jussieu avoit d'abord placé le genre *Elæocarpus* près des orangers et des guttifères<sup>1</sup>; mais dans un mémoire imprimé depuis quelques années<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> Gen. pl. p. 258.

<sup>2</sup> Ann. du Muséum, vol. XI.

il a justement pris ce genre pour le type d'une nouvelle famille, à laquelle il a donné le nom d'*Elæocarpées*. Dans ce mémoire, M. de Jussieu fait des rapprochemens très-justes sur plusieurs genres qui doivent entrer dans sa nouvelle famille; mais le manque presque absolu de fruits ne lui a pas permis d'assigner le caractère positif de cette famille et des genres qui la composent. Ce travail, très-important pour la science, ne pourra être fait que lorsque nous aurons vu un assez grand nombre d'espèces en fleurs et en fruits de cette nouvelle famille. Je me bornerai ici à quelques considérations sur le caractère du genre *Elæocarpus*, à la description exacte de l'espèce que j'ai vue vivante, et à dire que je regarde l'*Elæocarpus monocera* de Cavanilles<sup>1</sup> comme appartenant véritablement au genre *Elæocarpus*. D'après l'examen que j'ai fait des espèces de ce genre, on doit y rapporter toutes les plantes qui auront un calice composé de cinq folioles; une corolle formée de cinq pétales, partagés à leur limbe en plusieurs divisions; trente étamines ou à-peu-près disposées sur deux rangées, attachées entre un disque hypogyne et l'ovaire, terminées en pointe, et munies d'anthères fixées dans toute leur longueur un peu au-dessous du sommet des filets; un pistil simple, entouré à sa base d'un disque marqué de petits tubercules charnus; une droupe ovoïde renfermant un noyau couvert d'aspérités contenant au moins deux graines droites fixées par leur bord inférieur et intérieur, et dont l'embryon est droit et filiforme.

Comme la plupart des végétaux de la nouvelle Hollande que nous cultivons, l'*Elæocarpus acuminatus* passe l'hiver dans l'orangerie. C'est une plante d'un beau feuillage, curieuse par la disposition et la forme de ses fleurs, mais difficile à cultiver. Les fruits qui n'ont pas encore acquis un degré parfait de maturité sont de couleur verte extérieurement et couleur de carmin intérieurement. Dans de jeunes fruits j'ai vu positivement deux graines séparées par une cloison; mais, comme cette cloison semble disparaître dans les fruits plus avancés, je n'ose prononcer si le noyau est à une ou à plusieurs loges.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE L.

FIG. 1. Une foliole du calice. 2. Un pétale. 3. Une fleur dont on a ôté le calice et la corolle pour faire voir la disposition des étamines et du pistil. 4. Une étamine. 5. Le pistil. 6. Un fruit de dix-huit mois qui n'a pas encore acquis un degré parfait de maturité. 7. Idem, grossi et coupé transversalement pour faire voir sa structure intérieure. 8. Une graine séparée pour faire voir sa forme et le point par lequel elle est fixée. 9. Idem, coupée verticalement indiquant la forme et la direction de l'embryon.

<sup>1</sup> Cavan. Icon. vol VI, p. 1, t. 501.

# HOVEA.

ORDO NATURALIS, LEGUMINOSÆ. JUSS.

DIADELPHIA DECANDRIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. HORT. Kew. edit. 1812, vol. IV, p. 275. Brown. mss.

## SPECIES.

### HOVEA CELSI.

HOVEA : ramulis teretibus, foliis lanceolatis, subrhombeis, apice obtusis, mucronatis; pedunculis axillaribus, multifloris; calyce bracteisque pilosisculis.

---

Habitat in nova Hollandia.

---

PLANTE ligneuse, haute de quatre à six pieds (2 mètres); tronc droit, cylindrique, de la grosseur du petit doigt, couvert d'une écorce grisâtre, légèrement gercée, divisé à deux ou trois pieds (1 mètre) au-dessus du collet de sa racine.

RAMEAUX alternes, très-nombreux, plusieurs fois divisés, penchés à leur sommet, cylindriques, glabres inférieurement et souvent parsemés de poils à leurs extrémités.

FEUILLES alternes, ouvertes ou penchées, légèrement coriaces, longues d'un à deux pouces (5 centimètres) sur huit ou dix lignes de largeur (2 centimètres), planes, presque rhomboides, obtuses à la base et au sommet, et terminées par une pointe molle; entièrement glabres, excepté à l'époque de leur développement, où elles sont parsemées de poils en-dessous.

PÉTIOLE cylindrique, long de deux à trois lignes (5 centièmes de millimètres.)

FLEURS papillonacées d'un beau bleu, situées dans les aisselles des feuilles, et portées sur un pédoncule commun.

CALICE bilabié, pubescent, pourvu à sa base de deux petites bractées opposées; lèvre supérieure plus courte que l'inférieure, et partagée en trois dents égales et droites; l'inférieure est pliée longitudinalement en manière de carène, très-large, obtuse, et légèrement échancrée.

COROLLE polypétale; étendard ouvert, plus grand que les ailes et la carène, presque rond, terminé à sa base par un onglet très-court, échancré au sommet, marqué intérieurement d'une tache blanche, verdâtre au centre; carène formée de deux pétales plus petits que les ailes qui la recouvrent.

ÉTAMINES: dix, réunies par leur base en un tube membraneux, fendu antérieurement dans sa longueur; filets très-courts; anthères de couleur jaune, sphériques, s'ouvrant en-dehors.

PISTIL: ovaire pédicellé, ovale, légèrement comprimé sur les côtés; style arqué, stigmaté en tête.

FRUIT: gousse membraneuse, renfermant en général deux graines.

---

#### OBSERVATIONS.

Le genre *Hovea* est peu connu, peu nombreux en espèces, et son caractère générique, ainsi que celui d'un grand nombre de Légumineuses exotiques, n'est probablement pas bien fixé. Je crois cependant qu'il sera facile d'établir ce caractère sur la forme du calice, sur la disposition des étamines, et sur le fruit lorsqu'on aura vu plusieurs espèces garnies de fleurs, et de fruits mûrs.

Je cultive depuis 1812 un pied de l'*Hovea lanceolata* que j'ai obtenu de graines envoyées d'Angleterre. La nouvelle espèce de ce genre que je publie

---

\* *Botanical Magazine*, tab. 1624.

aujourd'hui est due à M. François Cels<sup>1</sup>, auquel je la dédic. M. Cels a obtenu cette plante de graines apportées de la nouvelle Hollande par l'expédition du capitaine Baudin, et il y a déjà deux ans qu'elle a fructifié dans l'une de ses baches tempérées.

L'*Hovea celsi* est un très-joli petit arbrisseau ; il se couvre d'un grand nombre de fleurs d'une belle couleur bleue ou violette, et mérite l'attention des cultivateurs pour l'ornement des baches et des serres tempérées.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE LI.

FIG. 1. Les pétales détachés du calice. 2. Calice vu par derrière et muni de ses deux bractées. 3. Id., vu de côté. 4. les étamines, dont on a ôté le tube membraneux qui les réunit en un seul corps. 5. Un fruit non développé. 6. Une feuille.

---

<sup>1</sup> M. François Cels est un de nos pépiniéristes les plus distingués : c'est le fils du célèbre Cels, dont Ventenat avoit commencé à publier le Jardin. M. F. Cels continue l'établissement de son père au Petit-Mont-Bouge, près Paris, il y a fait des augmentations dignes d'être admirées par les amateurs de plantes et par les cultivateurs les plus habiles.

# BOSSIÆA.

ORDO NATURALIS, LEGUMINOSÆ. JUSS.

DIADELPHIA DECANDRIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. VENTENAT Desc. pl. nov. I, pag. 7.

## SPECIES.

### BOSSIÆA COCCINEA.

BOSSIÆA: foliis alternis, ovalibus, ramulisque pilosiusculis, apice mucronatis, subsessilibus; pedunculis axillaribus solitariis, unifloris, superne hibracteatis.

---

Habitat in nova Hollandia.

---

PETIT ARBRISSEAU élevé d'un à deux pieds (6 décimètres), rameux dès sa base, à tige et à rameaux cylindriques et glabres; rameaux alternes, nus inférieurement, feuillus à leur sommet, couverts de poils blancs très-nombreux, et rapprochés les uns des autres.

FEUILLES alternes ovales, longues de six lignes (1 centimètre), ouvertes, souvent réfléchies, garnies de poils qui sont en plus grand nombre sur la face inférieure que sur la supérieure, et terminées par une pointe molle assez longue.

PÉTIOLE très-court, tomenteux, cylindrique, muni sur chacun de ses côtés d'une petite bractée filiforme.

FLEURS disposées une à une dans les aisselles des feuilles et portées sur un pédoncule grêle, muni au sommet de deux petites stipules en forme de cœur ciliées sur les bords.

**CALICE** membraneux, partagé à son limbe en deux lèvres dont la supérieure, plus large, est légèrement divisée en deux lobes obtus, et l'inférieure en trois petites dents égales et réfléchies à leur sommet.

**COROLLE** papillonacée de couleur jaune et rouge, de même grandeur à-peu-près que les feuilles; étendard réfléchi, échancré au sommet, plus large que long, marqué intérieurement et vers sa base d'une tache rouge, de forme semi-lunaire; ailes droites, plus courtes que la carène; carène droite, de couleur rouge, formée de deux pétales qui couvrent les étamines et le pistil.

**ÉTAMINES**: dix, réunies inférieurement en un tube membraneux, comprimé sur les côtés et fendu en-dehors dans toute sa longueur; anthères sphériques, de couleur jaune, s'ouvrant sur le côté en deux loges.

**PISTIL**: ovaire linéaire, stipité; style arqué; stigmate aigu.

**FRUIT**: gousse membraneuse, portée sur un long pédicelle, renfermant en général quatre graines.

#### OBSERVATIONS.

Le genre *Bossia* a été établi par Ventenat, et tous les botanistes qui ont écrit depuis lui l'ont adopté. Nous ne connaissons encore que très-peu d'espèces de ce genre, et toutes sont originaires de la nouvelle Hollande. Les calices et quelques autres organes des *Bossia* ont beaucoup de ressemblance avec ceux des *Hovea*, des *Aotus* et de plusieurs espèces de *Platylobium*; ce qui me fait présumer que les caractères de tous ces genres ont besoin d'être examinés de nouveau.

Le *Bossia coccinea* dont je donne la figure à la planche LII est originaire de la nouvelle Hollande. Je le cultive à Malmaison depuis 1811; il a fleuri tous les ans, mais il n'a pas encore fructifié. Comme toutes les plantes de la nouvelle Hollande, cette espèce doit être cultivée dans la serre tempérée.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE LII.

FIG. 1. Pétales séparés et placés de manière à ce qu'on distingue la forme de chacun d'eux.  
2. Calice supporté par son pédicelle pour faire voir la position des stipules, la forme du calice, et la disposition des étamines. 3. Pistil.

# DUVALIA.

ORDO NATURALIS, LEGUMINOSÆ. JUSS.

DIADELPHIA DECANDRIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

HABITUS: frutex crotallariæ similis habitu; rami alterni longitudinaliter sulcati pilosiusculi; folia alterna ternata, petiolata; foliolis obcordatis mucronulatis; stipulæ subulatæ ad basim petiolorum persistentes; florum corymbus terminalis.

FLORESCENTIA: calyx basi intrusus, limbo quinque dentatus, dentibus obtusis, rectis æqualibus, persistens.

COROLLA papillonacea; vexillum reflexum subrotundum emarginatum; alæ oblongæ carina appressæ, apice rotundatæ; carina arcuata, bipetala.

STAMINA; filamenta decem connata cum fissura dorsali, subæqualia; antheræ biloculares globosæ.

PISTILLUM; ovarium lineare, sessile; stylus brevis arcuatus; stigma acutum.

PERICARPIUM: legumen lineari-oblongum subtorulosum bivalve, polyspermum, coriaceam.

SEMINA reniformia.

## SPECIES.

### DUVALIA OXALIDIFOLIA.

DUVALIA: ramulis sulcatis pilosiusculis; foliis ternatis obcordatis mucronulatis glaucescentibus; corymbo terminali.

---

Habitat in nova Hollandia.

---

PLANTE ligneuse, haute de quatre ou six pieds (2 mètres); tronc



droit, cylindrique, recouvert d'une écorce grisâtre, divisée seulement vers le sommet.

RAMEAUX alternes, ouverts ou réfléchis, marqués longitudinalement de côtes saillantes, parsemés de quelques poils et couverts d'une épiderme rougeâtre.

FEUILLES alternes de couleur glauque, ternées, rapprochées les unes des autres et portées sur des pétioles cylindriques longs de quatre lignes (1 centimètre), pubescens; folioles longues de huit ou dix lignes (2 centimètres), éclancrées en manière de cœur à leur sommet et pourvues d'une petite pointe molle.

STIPULES: foliformes et persistantes, disposées une à une à la base et de chaque côté des pétioles.

FLEURS d'une belle couleur rose, disposées en corymbe à l'extrémité des jeunes rameaux.

CALICE en forme de cloche, membraneux, persistant, enfoncé à sa base, partagé à son limbe en cinq dents, droites, obtuses et égales.

COROLLE papillonacée; étendard penché arrondi, plus grand que les ailes et la carène, légèrement échancré au sommet et marqué à sa base interne d'une tache blanche; ailes droites obtuses et plus larges au sommet qu'à sa base; carène arquée, composée de deux pétales aigus au sommet plus étroits que les ailes.

ÉTAMINES dix presque égales; filets réunis dans leur moitié inférieure et formant un tube membraneux ouvert en-dessus dans toute sa longueur; anthères sphériques formées de deux loges.

PISTIL: ovaire linéaire, sessile, terminé par un style arqué; stigmat aigu.

FRUIT: gousse linéaire, alternativement renflée, longue de deux pouces (5 centimètres) et renfermant généralement cinq ou six graines réniformes.

#### OBSERVATIONS.

---

J'ai dédié le nouveau genre que je viens de décrire à M. Duval, médecin et botaniste distingué. M. Duval est mort il y a deux ans victime de son zèle pour

l'étude de la médecine. Pendant dix années consécutives il avoit suivi les savantes leçons de M. Richard à l'Ecole de Médecine, et il les avoit rédigées avec un soin particulier. En 1808 il publia l'abrégé de ses leçons<sup>1</sup>. Cet abrégé, imprimé sous les yeux de M. Richard, renferme presque toutes les idées de notre illustre professeur sur l'analyse du fruit, et compose un des ouvrages les plus importants parmi ceux imprimés de nos jours sur la botanique.

Le genre *Duvalia* est probablement originaire de la nouvelle Hollande, d'où les graines nous auront été apportées par l'expédition du capitaine Baudin. Ce nouveau genre a tout le port des *Crotalaria*, mais il en diffère essentiellement par son fruit, qui n'est pas renflé, et par d'autres caractères de moins d'importance. Cette plante ne se trouve dans aucun des herbiers de France et d'Angleterre. On ne la trouve non plus dans aucune collection de plantes vivantes, excepté à Malmaison, où je la cultive depuis 1808, et où elle a donné des fruits mûrs en 1813.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE LIII.

Fig. 1. Corolle étalée et détachée du calice pour faire voir la forme des pétales. 2. Fleur dont on a ôté la corolle pour faire voir la forme du calice et la disposition des étamines. 3. Etamines réunies en un seul corps. 4. Putil, dont l'ovaire est fécondé. 5. Un fruit de grandeur naturelle. 6. Une graine.

---

<sup>1</sup> Démonstrations de Botanique ou Analyse du Fruit, etc., publiées par H. A. Duval . . . . . Paris, 1808.

# LIPARIA.

ORDO NATURALIS, LEGUMINOSÆ. JUSS.

DIADELPHIA DECANDRIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. Juss. Gen. plant. pag. 353. SCHREB. Gen. plant. n° 1189.

## SPECIES.

### LIPARIA SPHERICA.

LIPARIA: florum capitulis cernuis; foliis lanceolatis, multinerviis, apice pungentibus, glabris, sessilibus.

---

Habitat ad Caput Bonæ Spei.

---

PLANTE ligneuse, de deux à trois pieds (1 mètre) de hauteur; très feuillue, rarement divisée dès sa base, entièrement glabre.

RAMEAUX alternes, ouverts, généralement courts et sans ordre régulier, cylindriques, marqués de petites cicatrices provenant de la chute des feuilles.

FEUILLES alternes, ouvertes, sessiles, coriaces, longues d'un pouce (2 centimètres), tronquées à la base, terminées au sommet par un piquant, glabre et d'un beau vert en-dessus, plus pâles au-dessous et marqués de sept ou neuf nervures qui naissent toutes de la nervure principale.

FLEURS jaunes formant par leur disposition un capitule penché, de deux à trois pouces de hauteur (8 centimètres) et d'un diamètre égal.

**CALICE** d'une seule pièce, glabre, membraneux, creusé à sa base, partagé à son limbe en deux lèvres, dont la supérieure, beaucoup plus grande que l'inférieure, est élargie au sommet en manière de spatule, et marquée de trois petites dents égales. La lèvre inférieure; plus courte, est droite et divisée en quatre parties, dont l'intermédiaire est bifide.

**COROLLE** de couleur jaune, deux fois plus grande que le calice; étendard lancéolé, peu réfléchi, comme partagé en trois lobes, marqué de trois petites dents au sommet, terminé inférieurement par un onglet court, arqué en-dedans; ailes droites de même longueur que la carène et l'étendard, étroites inférieurement, plus larges au sommet, et comme partagées en deux lobes; carène droite formée de deux pétales étroits, ongiculés, réunis par leur bord postérieur et enveloppant les étamines et le pistil.

**ETAMINES**: dix dont neuf sont réunis inférieurement par une membrane, et la dixième, isolée, se trouve placée au-devant de l'ovaire.

**PISTIL**: ovaire pédicellé, ovale, comprimé et garni de poils; style courbé; stigmat simple.

**FRUIT**: gousse ovale renfermant deux ou trois graines.

#### OBSERVATIONS.

Le genre *Liparia* est extrêmement voisin du *Borbonia*, et il est bien probable que plusieurs espèces appartenant à l'un ou l'autre de ces genres auroient été confondues. Le *Liparia sphaerica*<sup>\*</sup>, dont je donne une figure très-exacte à la planche LIV de cet ouvrage, a fleuri pour la première fois en 1812 dans les serres de Malmaison. C'est une plante très-belle et très-propre à l'ornement de nos serres tempérées. Toutes les espèces connues de *Liparia* et de *Borbonia* sont originaires du Cap de Bonne Espérance. Ces plantes sont d'une culture difficile, et nous n'en possédons qu'un très-petit nombre d'espèces vivantes.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE LIV.

FIG. 1. Une fleur entière, vue avant son entier développement. 2. Id. dont on a été les pétales pour faire voir la forme du calice et la disposition des étamines. 3. Neuf étamines réunies dans leur tiers inférieur par une membrane. 4. La dixième étamine et le pistil vus dans leur position naturelle. 5. L'étendard. 6. Une des ailes de la corolle. 7. La carène.

<sup>\*</sup> Botanic. Mag. tab. 1241. W. Spec. pl. t. III, p. 1214.

## ACACIA ARMATA.

ACACIA: foliis verticalibus, dimidiato-oblongis, glabris, mucronulatis, margine altero rectiusculo, altero rotundato; stipulis spinoso-setaceis; capitulis globosis, solitariis.

---

Habitat in nova Hollandia.

---

PETIT ARBRISSEAU, de trois à quatre pieds de hauteur (1 mètre), divisé dès le collet de sa racine, feuillu.

RAMEAUX alternes, droits, très-rapprochés les uns des autres, cylindriques, très-feuillus et parsemés de poils dans leur extrémité.

FEUILLES alternes, verticales, longues de six à huit lignes (1 centimètre), sessiles, mucronées, inégalement divisées par la nervure principale et disposées de manière à ce que l'un des bords regarde directement le rameau auquel elles sont attachées. Ce bord, qu'on doit considérer comme intérieur, est étroit et plane; l'autre, au contraire, que j'appelle extérieur, est arrondi, plus grand et à peine ondulé dans son contour.

STIPULES: deux petites épines, opposées, molles, très-foibles et ouvertes à la base de chaque feuille.

FLEURS: capitules globuleux, situés dans les aisselles des feuilles, solitaires ou géminés, pédonculés.

PÉDONCULES glabres, cylindriques, de la longueur des feuilles.

FLEURS d'un jaune clair, d'une odeur douce et agréable.

CALICE campanulé, blanchâtre, marqué à son limbe de cinq dents aiguës, droites et égales.

COROLLE: cinq pétales lancéolés, de la longueur du calice, droits, de couleur blanchâtre.

ÉTAMINES: trente ou quarante de couleur jaune, plus longues que la corolle; anthères sphériques.

PISTIL: ovaire petit; style unilatéral; stigmate en tête.

FRUIT: gousse pédicellée, velue, longue d'un à deux pouces (cinq centimètres), aplatie sur les côtés ou relevée en bosse, et renfermant plusieurs graines.

## OBSERVATIONS.

L'*Acacia armata*, ainsi que toutes les autres espèces de ce genre à feuilles simples, est originaire de la nouvelle Hollande. Quoiqu'il ne ressemble nullement à l'*Acacia paradoxa*, on pourroit les confondre l'un avec l'autre, parce que les descriptions spécifiques que nous avons de l'*Acacia armata* conviennent également à l'*Acacia paradoxa*. J'ai donc cru devoir changer le caractère spécifique de l'*Acacia* dont je donne la figure à la planche LV de cet ouvrage, et je vais établir les différences les plus sensibles qui existent entre l'*Acacia armata* et l'*Acacia paradoxa*.

L'*Acacia armata* diffère essentiellement du *paradoxa* par ses rameaux, qui sont droits, très-feuillus et parsemés de poils; par ses feuilles, entièrement glabres, presque planes et munies à leur base de stipules très-grêles, souvent molles et quelquefois légèrement piquantes. Dans l'*Acacia paradoxa*, au contraire, les rameaux sont penchés, moins feuillus, et nullement pubescens; les feuilles sont fortement ondulées, couvertes ainsi que les gousses d'un suc visqueux, et pourvues à leur base de deux stipules véritablement épineuses.

Je cultive ces deux espèces d'*Acacia* à Malmaison et à Navarre, depuis 1811; et ce n'est qu'après cinq années de culture qu'elles ont donné des fruits mûrs. Ces deux plantes sont toujours vertes, d'un port agréable, et demandent à passer l'hiver dans l'orangerie.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE LV.

FIG. 1. Une fleur entière, considérablement grossie. 2. Un pétale. 3. Un pistil. 4. Un fruit mûr. 5. Une graine.

<sup>1</sup> Botanical magazine tab. 1653. Aiton, hort. Kew, vol. V, p. 468.

# SOLANUM.

ORDO NATURALIS, SOLANÆÆ. *Juss.*

PENTANDRIA MONOGYNIA. *Linn.*

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. *Juss. Gen. plant. pag. 126. Dunal, monogr. pag. 115.*

## SPECIES.

### SOLANUM ROSTRATUM.

SOLANUM: caule aculeato, piloso, pilis apice stellatis; foliis pinnatifido-lobatis, lacinis obtusis; antheris declinatis, infima maxima.

---

Habitat: patria ignota.

---

PLANTE bisannuelle, haute de deux à quatre pieds (1 mètre), formant buisson, garnie sur presque toutes ses parties de piquans et de poils, divisés à leur sommet; tige cylindrique, feuillue et rameuse dès sa base, pourvue de piquans droits, d'inégale grandeur, de couleur jaunâtre et comprimés à leur base.

rameaux alternes, étalés, cylindriques, pourvus de piquans plus petits que ceux de la tige, et de poils grisâtres, droits et comme divisés, vers leur sommet, en quatre ou sept parties.

FEUILLES alternes, pétiolées, longues de cinq à huit pouces (6 à 8 centimètres), profondément divisées en cinq ou sept lobes arrondis à leur sommet et pourvues sur leurs nervures de quelques piquans plus nombreux à la face inférieure; parsemées en-dessus de quelques poils simples, et en-dessous de poils disposés en étoile.

## SOLANUM ROSTRATUM.

GRAPPE droite, latérale, longue de deux pouces (5 centimètres), composée de quatre ou huit fleurs ouvertes d'une belle couleur jaune.

CALICE persistant, divisé en cinq parties inégales, garni en-dehors de poils étoilés, et parsemé de piquans très-minces.

COROLLE d'une belle couleur jaune, d'un à deux pouces de diamètre (5 centimètres), glabre intérieurement, pubescente en-dehors; tube court, limbe étalé, partagé en cinq divisions inégalement aiguës ou arrondies.

ÉTAMINES: cinq, placées et inclinées du même côté, mais dont une, plus longue que les autres, est ventrue à sa base.

STYL: ovaire glabre, surmonté d'un style légèrement arqué; stigmate simple.

FRUIT: baie sphérique, de six à huit lignes de diamètre (1 centimètre), enveloppée par le calice, qui persiste, et renfermant intérieurement un grand nombre de graines.

## OBSERVATIONS.

La nouvelle espèce de *Solanum* que je viens de décrire étoit très-commune il y a huit ans dans nos jardins; aujourd'hui on la trouve difficilement, et sa rareté vient de la facilité avec laquelle elle se reproduit par ses graines, qui se sèment d'elles-mêmes. J'ai décrit et fait dessiner cette plante dès 1809; mais M. Dunal m'a devancé dans sa publication en la décrivant dans son excellent ouvrage sur les *Solanées*<sup>1</sup>. Ventenat avoit établi<sup>2</sup> un nouveau genre sous le nom de *Nycterium*, et il vouloit rapporter à ce genre tous les *Solanum* qui ont une étamine plus longue que les quatre autres. Ce caractère seul n'étant pas suffisant pour former un genre distinct, il est convenable de ne pas admettre le genre *Nycterium*, et de rendre au *Nycterium cordifolium* de Ventenat le nom de *Solanum vespertilio*<sup>3</sup>, sous lequel il a été connu primitivement.

Le genre *Solanum* offre des plantes utiles à tous les climats. Les habitants

<sup>1</sup> Dunal, monogr. des *Solanées*, p. 134, tab. 24.

<sup>2</sup> Jardin de Malmaison, tom. II, pag. 85, tab. 85.

<sup>3</sup> Wild. Sp. pl. tom. I, p. 1045.



# SOLANUM ROSTRATUM.

159

des pays chauds cultivent et mangent les fruits de plusieurs espèces; ceux des pays froids et tempérés cultivent le *Solanum tuberosum*, et trouvent dans ses racines un aliment inappréciable. Il y a peu d'années qu'il a été trouvé une nouvelle espèce de pomme de terre dans le royaume de Santa Fé de Bogota; l'auteur de cette découverte est le docteur Valenzuela, et nous en devons la communication à M. Palacio Faxardo, qui nous en a transmis la description, sous le nom de *Solanum valenzuela*.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE LVI.

*Un rameau garni de fleurs du Solanum rostratum.*

---

\* Mémoires du Muséum, t. II, p. 340.

# DALEA.

ORDO NATURALIS, LEGUMINOSÆ. JUSS.

DIADELPHIA DECANDRIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. Juss. Gen. pl. pag. 356. Ortega decas.

## SPECIES.

### DALEA MUTABILIS.

DALEA: decandra, spicis terminalibus oblongis, foliolis quinque octo jugis, obverse cordatis, glabris; limbo calycis ciliato.

---

Habitat in Mexico.

---

PLANTE ligneuse, de deux à quatre pieds de hauteur (1 mètre).

RAMEAUX alternes, droits, parsemés de feuilles à leur sommet.

FEUILLES alternes pinnées avec une impaire, ouvertes, pétiolées et munies de stipules: folioles cinq à six paires, obovales, légèrement échancrées à leur sommet, longues de six lignes (1 centimètre), ponctuées, et supportées par un pétiole.

PÉTIOLE commun, long d'un ou deux pouces (5 centimètres), comprimé et pourvu de poils à l'endroit seulement de l'insertion des pétioles partiels.

STIPULES: deux, opposées à la base des pétioles, linéaires, subulées.

ÉPI terminal, solitaire, long d'un à deux pouces (5 centimètres), cylindrique, fleurissant de la base au sommet.

## DALEA MUTABILIS.

141

**FLEURS** sessiles, munies d'une petite bractée ovale, de couleur blanche et bleue.

**CALICE** campanulé, diaphane, marqué de dix petites côtes saillantes, ponctuées; cilié à son limbe et divisé en cinq dents.

**COROLLE** papillonacée, composée de cinq pétales onguiculés, très-ouverte; étendard ovale; ailes droites; carène formée de deux pétales, rapprochés par leur bord postérieur.

**ETAMINES** : dix, réunies en un seul corps, attachées aux ailes et à la carène; filets d'égale grandeur; anthères sphériques.

**PISTIL** : ovaire pubescent; style filiforme; stigmate aigu.

**FRUIT** : gousse lenticulaire, uni-sperme, pubescente.

### OBSERVATIONS.

Le genre *Dalea* est très-ancien et très-voisin du genre *Psoralea*, avec lequel il est facile de le confondre, si l'on n'apporte pas une attention toute particulière à l'examen de ses fleurs. Nous devons les caractères précis de ce genre à M. Casimir Ortega, qui le premier en a donné une bonne description dans un ouvrage très-rare, intitulé : *Decas plantarum*. Presque tous les *Dalea* sont originaires du Mexique, où M. de Humboldt et moi en avons trouvé un assez grand nombre de nouvelles espèces, qui seront décrites dans notre grand ouvrage (*Nova Genera et sp.*). Les *Dalea* sont pour la plupart de petits arbrisseaux à fleurs bleues, mêlées de rose et de blanc. Nous ignorons encore l'usage qu'on peut en faire; mais il est probable qu'ils ont comme les *Psoralea* des propriétés stomachiques et sudorifiques.

### EXPLICATION DE LA PLANCHE LVII.

FIG. 1. Une fleur entière avancée dans sa floraison et munie d'une bractée. 2. Pétales détachés du calice et vus dans l'ordre de leur disposition. 3. Un calice. 4. La carène, les ailes et les étamines, vus avant leur entier développement. 5. L'étendard. 6. Le pistil. 7. Le même dont l'ovaire est grossi. 8. Le fruit enveloppé dans le calice. 9. Une gousse.

## DALEA BICOLOR.

DALEA: decandra, spicis terminalibus elongatis, foliis subquinque jugis, obverse cordatis, pilosiusculis; calyce villosa.

---

Habitat in Mexico.

---

PLANTE ligneuse, haute d'un à deux pieds (6 décimètres), grêle, peu feuillue, peu rameuse, recouverte inférieurement d'une écorce grisâtre, presque lisse et glabre.

RAMEAUX alternes, droits, cylindriques, garnis de poils très-courts, imbriqués à la manière des tuiles, et d'un blanc argenté.

FEUILLES alternes, pinnées avec une impaire, longues d'un pouce (2 centimètres), parsemées de poils soyeux, très-courts; folioles au nombre de quatre ou cinq paires, ob-ovales, généralement échan-crées à leur sommet, marquées en-dessous de points glanduleux et supportées par un pétiole très court.

PÉTIOLE commun, très-grêle, pubescent, pourvu à sa base de deux petites stipules opposées et persistantes.

EPI terminal, solitaire, long d'un à deux pouces (5 centimètres), cylindrique, supporté par un pédoncule de même longueur que lui.

FEURS sessiles, de couleur blanche et bleue, mêlées de rose; munies à leur base d'une petite bractée ovale, pubescente et terminée par une pointe aiguë.

CALICE campanulé, couvert de poils argentés, divisé à son limbe en cinq petites dents dont l'inférieure est prolongée et plus grande que les autres.

COROLLE papillonacée; étendard ovale, longuement onguiculé, opposé à la carène et aux ailes; carène de même longueur que les ailes, plus grande que l'étendard et comme réunie en un seul corps avec les étamines et le pistil.

ÉTAMINES: dix, réunies en un seul corps fixé aux ailes et à la carène;

DALEA BICOLOR.

143

filets très-grêles d'inégale longueur; anthères jaunes, sphériques et à deux loges.

PISTIL: ovaire pubescent, comprimé sur les côtés, terminé par un style long, très-grêle; stigmaté en tête.

FRUIT: gousse membraneuse, couverte par le calice, qui persiste, renfermant une seule graine.

---

OBSERVATIONS.

La nouvelle espèce de *Dalea* que je viens de décrire est originaire du Mexique, d'où M. de Humboldt et moi en avons apporté les graines. Cette plante a déjà été décrite par Willdenow<sup>1</sup>, qui l'a vue fleurir à Berlin. Le *Dalea bicolor* a fleuri dès 1810 à Malmaison, où je l'ai fait dessiner. Cette plante passe l'hiver dans l'orangerie. Elle a peu d'éclat et est peu recherchée des cultivateurs. Je ne l'ai vue en France que dans la collection de Malmaison et à Navarre.

EXPLICATION DE LA PLANCHE LVIII.

FIG. 1. Pétales détachés du calice et vus dans leurs positions respectives. 2. Le calice avec les étamines. 3. Étamines séparées des ailes et de la carène. 4. Pistil.

---

<sup>1</sup> Wild. Hort. berol. pag. et tab. 89.

# PROTEA.

ORDO NATURALIS, PROTEÆ. JUSS.

TETANDRIA MONOGYNIA. LINN.

Vid. BROWN, in LINN. soc. transcript. 10, pag. 74. JUSS. GEN. pl. pag. 78.

## SPECIES.

### PROTEA RADIATA.

PROTEA: ramulis teretibus, hirsutis; foliis sessilibus, cordato-oblongis, utrinque pilosiusculis, ciliatis, externe argenteo-pilosis.

---

Habitat ad Caput Bonæ Spei.

---

PLANTE ligneuse, haute de six à huit pieds (2 mètres), rarement divisée dès sa base, couverte de poils sur presque toutes ses parties et d'un aspect argenté.

RAMEAUX alternes, peu ouverts, cylindriques, garnis de poils longs de couleur blanche, ouverts et assez nombreux pour couvrir la presque totalité des rameaux.

FEUILLES sessiles, longues de deux à trois pouces (8 centimètres), peu ouvertes, fortement membraneuses, de couleur glauque, ciliées, échancrées en forme de cœur à la base, obtusément aiguës au sommet, parsemées sur l'une et l'autre face de poils blancs plus nombreux en-dessous qu'en-dessus.

FLEUR terminale et solitaire, très-grande et d'une belle couleur rouge.

CALICE ou mieux INVOLUCRE, ovoïde, composé d'un grand nombre de folioles, imbriquées, d'un rouge très-vif, ciliées sur les bords, presque glabres intérieurement et garnies en-dehors de poils argentés.

COROLLE : un très-grand nombre fixées sur un receptacle commun

PROTEA RADIATA.

145

comme dans les plantes composées; chacune d'elles est velue, formée de quatre pétales linéaires, dont un est libre, et les trois autres sont réunis par leurs bords dans leur partie supérieure; tous sont légèrement plus larges au sommet et concaves intérieurement pour recevoir les étamines.

ÉTAMINES au nombre de quatre; filets très-courts, attachés un peu au-dessous de la partie concave des pétales; anthères linéaires.

PISTIL: ovaire courtement pédicellé, enveloppé par des poils longs de couleur carmelite, fixés autour et au sommet du pédicelle; style filiforme plus long que la corolle; stigmathe subulé.

FRUIT: non observé.

---

OBSERVATIONS.

La nouvelle espèce de *Protea* que je viens de décrire est originaire du Cap de Bonne-Espérance, d'où les graines ont été envoyées en 1809. Je l'ai obtenue de semis faits à Navarre, en mars 1810. Lorsque cette plante étoit encore jeune, j'avois cru pouvoir la rapporter au *Protea speciosa* ou au *Protea longiflora*; mais les différences sensibles qu'elle présente aujourd'hui dans sa fleur et dans ses autres parties me déterminent à en faire une espèce nouvelle. Le nom de *Radiata* sous lequel je la désigne n'est pas étranger aux cultivateurs. C'est sous ce même nom que j'ai vu ce *Protea* dans le superbe établissement de MM. Lée et Kennedy, pendant le mois d'août 1814. Le *Protea radiata* est une très-belle plante d'ornement; depuis trois ans, on la voit fleurir chaque année dans les serres de Malmaison.

EXPLICATION DE LA PLANCHE LIX.

Une branche du *Protea radiata*.

# MIMULUS.

ORDO NATURALIS, SCROPHULARIÆ. *Juss.*

PERSONATÆ. *Brown.*

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. *Linn.*

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. *Juss. Gen. plant. pag. 122. Brown. Prod. pag. 439.*

## SPECIES.

### MIMULUS LUTEUS.

*Mimulus*: foliis ovalibus, multinerviis, denticulatis, inferioribus petiolatis, caulibus basi repentibus, ascendentibus pilosisculis, projectura foliorum subtragonis, pedicellis folio florali brevioribus.

---

Habitat in Peruviae humidis et umbrosis.

---

PLANTE herbacée, haute d'un pied à un pied et demi (5 décimètres), parsemée sur les tiges et sur les pédicelles de poils blancs très-courts.

RACINES fibreuses, vivaces.

TIGES couchées dans leur partie inférieure, droites dans la supérieure, de la grosseur d'une plume à écrire, garnies de feuilles depuis la base jusqu'au sommet, marquées de quatre angles peu saillans, qui semblent formés par la décurrence de l'une des nervures des feuilles.

FEUILLES opposées, ovales, longues d'un à trois pouces (6 centimètres), inégalement dentées sur les bords, marquées en-dessous de plu-



### MIMULUS LUTEUS.

147

sieurs nervures saillantes, membraneuses, d'un beau vert; les inférieures sont supportées par des pétioles courts et dentés, comme les feuilles sur les bords; les supérieures constamment plus courtes, sessiles et demi-amplexicaules.

FLEURS d'un beau jaune, longues d'un pouce, bilabiées, disposées une à une dans les aisselles des feuilles et souvent comme disposées en grappes à l'extrémité de la tige principale.

PÉDICELLE cylindrique, légèrement velu, uniflore, plus court que les feuilles florales.

CALICE en forme de cloche, long de six lignes (1 centimètre), lâche, membraneux, divisé en son limbe en cinq dents, marqué de cinq côtes saillantes, membraneuses, qui s'étendent de la base du calice au sommet de chaque dent.

COROLLE longue d'un pouce, bilabée, ventrue; tube cylindrique, plus court que le calice; gorge inégalement ventrue, lèvre supérieure partagée en deux lobes; l'inférieure, marquée intérieurement de points rouges et garnie de poils jaunes, est partagée en trois lobes, dont l'intermédiaire est plus large que les autres, et légèrement échancré au sommet.

ÉTAMINES : quatre, insérées au tube de la corolle, incluses, didynames; filets grêles, légèrement arqués; anthères composées de deux loges ovales, attachées par leur sommet, écartées et terminées en pointe à leur base.

PISTIL : ovaire ovale, glabre, supporté par un court pédicelle; un seul style droit, de même longueur que les étamines; stigmaté formé de deux lames orbiculaires.

FRUIT : capsule ovale, renfermée dans le calice qui persiste, comprimée, marquée de deux sillons opposés qui s'étendent depuis la base jusqu'au sommet, terminée par le style qui persiste, et divisée intérieurement en deux loges qui s'ouvrent sur les côtés; graines sphériques, très-nombreuses, attachées sur un réceptacle central, légèrement charnu.

## OBSERVATIONS.

La plante que je viens de décrire est bien certainement le *Mimulus luteus* dont Feuillée nous a donné une figure en noir<sup>1</sup>. J'ai cru pendant long-temps avec M. Decandole<sup>2</sup> que cette espèce étoit nouvelle; mais un examen plus exact de la plante, fait à diverses époques de sa végétation, ne me laisse aucun doute sur la détermination que j'en fais aujourd'hui.

Les grandes différences qu'on observe dans cette plante viennent assurément du terrain dans lequel on la cultive et des soins qu'on lui donne. En général, elle vient très-belle dans nos jardins et avec une profusion telle qu'en peu de temps elle se rendroit maîtresse de tout un terrain. Si on examine avec soin les pieds qui se trouvent sur les bords de la planche ou de la bordure, on verra qu'ils sont en tout semblables à l'échantillon que Feuillée a fait graver; tandis que ceux du centre, plus forts, présentent un aspect tout différent.

Le *Mimulus luteus* est originaire du Pérou, où il croît certainement dans une région élevée. Cette plante est annuelle, de pleine terre, et se sème d'elle-même.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE LX.

Fig. 1. Un fruit entier dont on a rompu le calice pour faire voir la forme de la capsule. 2. Une des valves de la capsule, vues intérieurement pour observer la forme et la disposition du réceptacle. 3. Une graine.

<sup>1</sup> Feuill. Peruv. t. II, p. 745, tab. 34.

<sup>2</sup> Decand. Catalogue.

## ERICA FULGIDA.

ERICA: ramulis virgatis; foliis verticillatis, setaceo-linearibus, tremulis, margine cartilagineis, floribusque glaberrimis; floribus axillaribus, infra ramulorum apicem spicato-aggregatis; corollis cylindraceo-tubulosis, subarcuatis, laciniis obtusis, subrecurvis; antheris muticis; ovario superne hirsuto; foliolis calycinis e basi dilatatis, lineari-subulatis, glaberrimis.

---

Habitat ad Caput Bonæ Spei.

---

PLANTE ligneuse, haute de quatre à six pieds (2 mètres), glabre sur toutes ses parties.

RAMEAUX en bague, droits, garnis de feuilles depuis leur base jusqu'à leur sommet.

FEUILLES verticillées, tremblantes, longues d'un pouce (2 centimètres), linéaires, presque cylindriques, légèrement cartilagineuses sur les bords et terminées par une pointe aiguë.

FLEURS en tube, d'un rouge éclatant, placées une à une dans les aisselles des feuilles, pédicellées et comme rassemblées en épi au-dessous du sommet des rameaux.

PÉDICELLE allongé, portant une seule fleur, et muni de trois bractées, dont une, plus courte, située sur le milieu du pédicelle; les deux autres, plus longues, sont placées au haut du pédicelle.

CALICE infère, composé de quatre folioles ovales et membraneuses dans leur tiers inférieur, linéaires et subulées dans le reste de leur longueur.

COROLLE tubulée, longue d'un pouce (2 centimètres), cylindrique, légèrement arquée et partagée à son limbe en quatre divisions légèrement ouvertes, obtuses et échancrées à leur milieu.

ÉTAMINES: huit, de même longueur que la corolle, fixées autour d'un disque hypogyne; filets cylindriques diversement colorés, légèrement arqués en-dedans dans leur tiers supérieur; anthères composées de deux loges réunies par leur base, divergentes à leur sommet.

PISTIL : ovaire supère, rétréci à sa base, garni au sommet de poils blancs, droits; terminé par un style droit, plus long que la corolle, de couleur rouge; stigmate capité, de couleur brune et comme partagé en quatre divisions.

FECIT : non observé.

## OBSERVATIONS.

Andrews, dans son bel ouvrage sur les Bruyères, a donné la figure de la plante que je viens de décrire, et il l'a désignée sous le nom d'*Erica vestita fulgida*. J'ai dit plus haut, en parlant de l'*Erica vestita*, qu'on avoit désigné sous ce nom plusieurs plantes qui, examinées vivantes et dans un état de végétation parfaite, seroient probablement séparées de l'*Erica vestita*, et formeroient des espèces différentes. La bruyère dont je donne la figure à la planche LXI offre assez de caractères pour être regardée comme une espèce distincte, et je la désigne sous le nom d'*Erica fulgida*, qui lui convient parfaitement par l'extrême beauté de ses fleurs. J'ai décrit très en détail toutes les parties de cette espèce, et il est facile de voir toutes les différences notables qui existent entre elle et les espèces décrites sous le nom de *vestita*.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE LXI.

FIG. 1. Une corolle fendue longitudinalement et étalée pour faire voir la forme de ses divisions.  
2. Une fleur dont on a ôté la corolle pour faire voir la disposition des étamines. 3. Une des folioles du calice. 4. Le pistil avec les étamines. 5. Le pistil séparé des étamines.

# BEGONIA.

ORDO NATURALIS, BEGONIACEÆ.

MONÆCIA POLYANDRIA. LINN.

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. Juss. Gen. plant. pag. 436. Dryand. act. soc. LINN. Lond. I, pag. 158.

## SPECIES.

### BEGONIA HUMILIS.

BEGONIA: caulescens, foliis hispidis semi-cordatis, acutis, inæqualiter dentatis, ciliatis; capsulis rotundatis, parum inæqualibus.

---

Habitat in America meridionali.

---

PLANTE vivace, haute d'un pied (3 décimètres), produisant un grand nombre de tiges droites, rarement divisées, charnues, comme transparentes et souvent teintées en rose; les nœuds sont légèrement renflés et comme articulés.

FEUILLES alternes, longues de deux à trois pouces (6 centimètres), à demi cordées, ouvertes, glabres en-dessous, parsemées en-dessus de poils blancs, inégalement dentées sur les bords, et ayant chaque dent terminée par un poil.

PÉTIOLÉS un tiers plus courts que les feuilles, creusés en gouttière intérieurement et garnis de poils dans leur tiers supérieur.

STIPULES: deux, opposées à la base de chaque pétiole, lancéolées, diaphanes, denticulées, obliques à la base, persistantes.

## BEGONIA HUMILIS.

PEDUNCULES axillaires, longs d'un à deux pouces (5 centimètres), munis de petites bractées, partagés en deux à leur sommet, et chaque division portant une ou plusieurs fleurs de couleur blanche.

FLEURS mâles et fleurs femelles placées sur le même pied.

*Fleur mâle.*

CALICE: il n'y en a pas.

COROLLE: composée de quatre pétales dont deux extérieurs, presque ronds, ouverts; deux intérieurs linéaires et plus courts.

ETAMINES: vingt ou à-peu-près, réunies en un seul faisceau plus court que la fleur; anthères jaunes, ovales droites, biloculaires: chaque loge est fixée au bord extérieur du filet et s'ouvre longitudinalement en-dehors.

*Fleur femelle.*

CALICE: il n'y en a pas.

COROLLE supère, composée de cinq pétales ovales, de largeur inégale, persistans.

PISTIL: ovaire infère, triangulaire, inégalement ailé, terminé par trois styles charnus de couleur jaune, pubescens, divisés en deux au sommet; stigmates obtus, divergens.

FRUIT: capsule triangulaire, munie sur chaque angle d'une aile ou prolongement membraneux dont une constamment plus grande que les autres, ombiliquée, divisée intérieurement en trois loges polyspermes; graines rondes, très-petites, très-nombreuses, placées sur un réceptacle central pourvu de trois prolongemens anguleux qui remplissent presque en totalité l'intérieur des loges.

## OBSERVATIONS.

---

Nous devons à Dryander une excellente monographie du genre *Begonia* <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Dryand. act. societ. Lin. Lond. p. 159.

Depuis le travail de ce célèbre botaniste, on en a publié quelques espèces nouvelles; mais les plantes de ce genre sont plus que doublées par le nombre des espèces inconnues que M. de Humboldt et moi avons apportées de notre voyage, et par celles qui ont été trouvées dans le Mexique seulement par Cervantes, Mocino et Sessé. Le Mexique est de tous les pays celui qui offre le plus d'espèces de ce genre.

Le *Begonia*, ainsi que l'a déjà observé M. de Jussieu<sup>1</sup>, est un genre isolé et qui ne peut être rapproché d'aucun autre genre connu: il est, d'après cela, convenable de le prendre pour le type d'une nouvelle famille, qui sera bien désignée sous le nom de *Begoniaceae*.

L'espèce dont je viens de donner la description est bien certainement le *Begonia humilis*, et il sera facile de reconnoître cette plante, d'après la figure très-exacte que j'en donne à la planche LXII de cet ouvrage. Nous cultivons le *Begonia* depuis long-temps dans nos serres, et le manque d'une bonne figure l'avoit fait regarder par plusieurs botanistes comme une espèce nouvelle.

## EXPLICATION DE LA PLANCHE LXII.

FIG. 1. Une fleur femelle. 2. Une fleur mâle.

---

<sup>1</sup> Juss. Gen. pl. 436.

## BEGONIA EVANSIANA.

BEGONIA: foliis inæqualiter cordatis, serrulatisque, ciliatis, acuminatis, supra retrorsum asperiusculis: capsulæ, alis acutangulis, una majore.

---

Habitat in China.

---

PLANTE vivace, haute d'un à trois pieds (9 décimètres), à racines tubéreuses.

TIGES: plusieurs, de la grosseur du petit doigt, cylindriques, herbacées, de couleur verte dans presque toute leur étendue, mais d'un rouge foncé vers les nœuds qui sont renflés et comme articulés.

FEUILLES alternes, longues de six à dix pouces (2 décimètres), obliquement cordées, acuminées au sommet, inégalement denticulées sur les bords, d'un vert de couleur rouge foncé en-dessous, d'un vert brillant en-dessus, et parsemées de petits tubercules terminés par un poil court et dur.

PÉTIOLE: long de deux à quatre pouces (1 décimètre), cylindrique, quelquefois rougeâtre à la base et au sommet.

STIPULES: deux, opposées à la base de chaque pétiole, lancéolées, diaphanes, très-entières, caduques.

PÉDONCULES axillaires d'un beau rose, dichotomes, articulés et portant à l'extrémité de leur division deux ou trois fleurs.

FLEURS mâles et fleurs femelles d'une belle couleur rose, disposées sur le même pied et toutes pédicellées.

### *Fleur mâle.*

CALICE: il n'y en a pas.

COROLLE: formée de quatre pétales, ouverts, dont deux extérieurs, plus grands, arrondis, légèrement échancrés à leur sommet, et deux intérieurs plus petits, élargis vers le sommet, rétrécis à la base.

ÉTAMINES très-nombreuses, réunies en un seul corps par leur base ou fixées au sommet d'un réceptacle central, filiforme, de même cou-



leur que la corolle; filets grêles, de couleur jaune, terminés par une petite tête charnue, concaves sur les côtés, et logeant dans ce point les anthères; poussière grisâtre.

*Fleur femelle.*

CALICE: il n'y en a pas.

COROLLE composée de quatre pétales dont deux extérieurs plus grands, orbiculaires, entiers, deux intérieurs plus petits.

PISTIL: ovaire infère, triangulaire, inégalement ailé, terminé par trois styles charnus divisés à leur sommet en deux parties ou stigmates tournés en spirale, de couleur pistache et velues.

BRACTÉES: deux, opposées à la base de chaque pédicelle commun, plus grandes que les pétales, arrondies, diaphanes et caduques.

FRUIT: capsule triangulaire de couleur rose, pourvue sur chaque angle d'une aile dont deux sont arrondies, et la troisième prolongée en forme d'angle vers son sommet, divisée intérieurement en trois loges renfermant chacune un très-grand nombre de graines fixées sur un réceptacle central.

OBSERVATIONS.

La plante que je viens de décrire a déjà été publiée sous le nom de *Begonia evansiana*<sup>1</sup> et sous celui de *Begonia discolor*<sup>2</sup>. Ce dernier nom convenant à presque toutes les espèces de ce genre, je lui conserve le premier, qui rappelle le nom de M. Evans, naturaliste anglais, auquel nous devons une grande quantité de plantes qu'il a apportées d'Amérique.

Le *Begonia evansiana* est une très-belle plante d'ornement; il se multiplie avec profusion et très-facilement par le moyen de petits tubercules solides qui se forment dans les aisselles des feuilles, lorsque la floraison est déjà avancée. Cette plante demande à être cultivée en serre chaude, et l'on peut en avoir des pieds en fleur toute l'année.

EXPLICATION DE LA PLANCHE LXIII.

*Un rameau du Begonia evansiana.*

<sup>1</sup> Andr. Bot. Reposit. tab. 627.

<sup>2</sup> Bot. Magaz. tab. 1478.

# DIGITALIS.

ORDO NATURALIS, PERSONATÆ. *BROWN.*

SCHROPHULARIÆ ET PEDICULARES. *JUSS.*

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. *LINN.*

## CHARACTER GENERICUS.

Vid. *Juss. Gen. plant. pag. 120.*

## SPECIES.

### DIGITALIS PURPURASCENS.

*DIGITALIS* : foliis lanceolatis, serratis, basi amplexicaulibus; foliolis calycinis lanceolatis, subtus pubescentibus; corolla leviter ventricosa, galea obtusa, emarginata; labii inferioris lacinia intermedia oblonga, obtusissima; caule et ovario subpubescentibus.

---

Habitat in Palatina.

---

PLANTE vivace, haute d'un à deux pieds (6 décimètres), parsemée de poils sur toutes ses parties.

TIGES: plusieurs, droites, cylindriques, simples, garnies de feuilles dans toute leur longueur.

FEUILLES radicales et caulinaires; les premières, étendues sur le sol, sont généralement plus longues et plus larges que les autres. Celles-ci, alternes, semi-amplexicaules, longues de six ou huit pouces (2 décimètres), ouvertes, réfléchies, étroites et entières à la base, inégalement et largement dentées dans le reste de leur longueur; plus larges au milieu et terminées en pointes; glabres en-dessus, légèrement pubescentes en-dessous, et membraneuses.

DIGITALIS PURPURASCENS. 157

EPI terminal, lâche, composé de fleurs pédicellées et munies d'une bractée à la base de chaque pédicelle.

CALICE infère, persistant, profondément divisé en cinq folioles lancéolées, presque égales, légèrement pubescentes en-dehors.

COROLLE monopétale, d'une belle couleur rose, penchée; tube droit, cylindrique; gorge renflée, ventrue d'un côté, et marquée intérieurement de points verdâtres; limbe oblique, inégalement partagé en quatre lobes courts et arrondis.

ETAMINES: cinq, dont une stérile, attachées au tube de la corolle; filets arqués, comme rangés deux par deux; anthères ovales, à loges écartées.

PISTIL: ovaire supère, ovale, comprimé, légèrement pubescent; style filiforme, droit; stigmatte aigu.

FRUIT: capsule ovale, biloculaire, membraneuse; graines petites, très-nombreuses, fixées sur un réceptacle commun.

OBSERVATIONS.

Le *Digitalis purpurascens* est une très-belle plante d'ornement, et a de très-grands rapports avec le *Digitalis purpurea* qui fait l'ornement de nos jardins et de nos forêts; nous devons cette nouvelle espèce de digitale à Roth, qui l'a indiquée à la page 62 de son catalogue. Cette plante est très-rare en France; je ne l'ai vue qu'à Malmaison, où je la cultive depuis 1811.

La grande analogie qu'a notre *Digitale* avec le *Digitalis purpurea* me fait présumer que ces deux plantes doivent jouir des mêmes propriétés: elles méritent l'une et l'autre l'attention des cultivateurs et des médecins.

EXPLICATION DE LA PLANCHE LXIV.

Un rameau du *Digitalis purpurascens*.

FIN.

# TABLE.

<i>Acacia armata</i> , pag. 135, pl. 55	<i>Hibiscus sabdariffa</i> , pag. 74, pl. 29
— <i>curvifolia</i> , 99, 40	<i>Hovea celsi</i> , 125, 51
— <i>linifolia</i> , 51, 19	<i>Ixora speciosa</i> , 119, 49
— <i>subulata</i> , 110, 45	<i>Linaria pauciflora</i> , 48, 18
<i>Banksia marcescens</i> , 116, 48	<i>Linum trigynum</i> , 45, 17
<i>Begonia evansiana</i> , 154, 63	<i>Liparia spherica</i> , 133, 54
— <i>humilis</i> , 151, 62	<i>Lobelia excelsa</i> , 112, 46
<i>Boehmeria caudata</i> , 40, 15	— <i>fulgens</i> , 19, 7
<i>Bossiaea coccinea</i> , 128, 52	— <i>surinamensis</i> , 97, 39
<i>Cactus ambiguus</i> , 90, 36	<i>Lopezia racemosa</i> , 65, 25
— <i>speciosus</i> , 8, 3	<i>Magnolia glauca</i> , 103, 42
<i>Chorizema ilicifolia</i> , 88, 35	— <i>macrophylla</i> , 84, 33
<i>Correa viridiflora</i> , 32, 12	— <i>yulan</i> , 53, 20
<i>Cotyledon tardiflorum</i> , 93, 37	<i>Melaleuca chlorantha</i> , 22, 8
<i>Dalea bicolor</i> , 142, 58	<i>Metrosideros glauca</i> , 86, 34
— <i>mutabilis</i> , 140, 57	— <i>pallida</i> , 101, 41
<i>Digitalis purpurascens</i> , 156, 64	— <i>saligna</i> , 11, 4
<i>Duvalia oxalidifolia</i> , 130, 53	<i>Mimulus luteus</i> , 146, 60
<i>Elæocarpus acuminatus</i> , 122, 50	<i>Pæonia albiflora</i> , fl. pl. 114, 47
<i>Erica concinna</i> , 59, 22	— <i>daurica</i> , 25, 9
— <i>edelinia</i> , 43, 16	— <i>moutan</i> , 1, 1
— <i>fulgida</i> , 149, 61	— <i>moutan</i> , var. <i>b.</i> 61, 23
— <i>grandiflora</i> , 28, 10	<i>Pimelea linifolia</i> , 79, 31
— <i>patersonia</i> , 108, 44	<i>Pittosporum tomentosum</i> , 56, 21
— <i>purpurea</i> , 72, 28	<i>Protea radiata</i> , 144, 59
— <i>versicolor</i> , 95, 38	<i>Rhexia glandulosa</i> , 70, 27
— <i>vestita</i> , 106, 43	— <i>pendulifolia</i> , 68, 26
<i>Eucalyptus diversifolia</i> , 35, 13	<i>Sida pulchella</i> , 5, 2
<i>Eupatorium deltoideum</i> , 38, 14	<i>Silene chloræfolia</i> , 14, 5
<i>Gompholobium furcellatum</i> , 30, 11	<i>Solanum rostratum</i> , 137, 56
<i>Goodenia grandiflora</i> , 16, 6	<i>Tristania nerifolia</i> , 76, 30
<i>Heliotropium corymbosum</i> , 82, 32	<i>Zieria smithii</i> , 62, 24

---

## FAUTES A CORRIGER.

Page 12, ligne 9, *composé*, lisez *composée*.

*Ibid.* ligne 18, *côtes*, lisez *côtés*.

14, ligne 8, *la virgule qui est après foliis* doit être placée avant ce mot.

*Ibid.* ligne 12, *fibrates*, lisez *fibreuses*.

39, ligne 1, *terminale composée*, lisez *terminal composé*.

51, ligne 15, *petitis*, lisez *petites*.

52, ligne 1, *une*, lisez *un*.

*Ibid.* ligne 2, *formée*, lisez *formé*.

63, ligne 18, *terminale*, lisez *terminal*.

73, ligne 20, *pédicel*, lisez *pédicelle*.

75, ligne 15, *sez*, lisez *ces*.

76, ligne 18, *glaucescentibus*, lisez *glaucescentibus*.

86, ligne 3, *congestis*, lisez *congestis*.

97, ligne 1, *grabiuncula*, lisez *glabriuncula*.

103, ligne 1, *pilosiusculis*, lisez *pilosiusculis*.

119, ligne 3, *tetandria*, lisez *tetrandria*.

*Ibid.* avant-dernière ligne, *d'aleine*, lisez *d'aleine*.

130, ligne 18, *coriaceam*, lisez *coriaceam*.

131, ligne 11, *foliformes*, lisez *filiformes*.



*Paeonia . Moutan*



*Sida pulchella*



*Cylindropuntia - speciosa.*





*Metrosideros fulgens*



*Silene chloropetala*



*Gordonia Guineensis.*



*Lobelia fulgens.*



*Melaleuca Sphaerantha*



*Paeonia officinalis*



*Erica grandiflora*



*Compholobium fasciculatum*





*Correa Lindleyana*



*Smilax (Smilax)*



*Eupatorium ciliatum*



*Bernonia umbellata*



9900

*C. White (S. White?)*



*Mimulus aurantiacus*



*Linaria Purpurea.*



*Serena Linpho.*





*Magnolia speciosa*



*Diaphorisma frutescens*



*Erica Cinerea.*



*Paeonia Moutan* L.



*Salvia lucida.*



*Lophosiphon Roseum.*




*Rorippa pendulifolia.*



*Rhynchospora glauca.*





1

*Eriophorum angustifolium*




3



4



5



6



*Mimosa pudica*



*Lysimachia fruticulosa*





*Eriogonum fasciculatum*



*Verbena officinalis* (L.)



*Nelumbo alba*



*Banksia* *terrestris*



*Chamaecyparis thyoides*





*Opuntia* *monocarpa*



*Euphorbia* *Dryas*



*Erica carnea.*



*Salvia splendens*



*Mimosa pudica*



*Myrsine L.*



*Magnolia*



*Spina Lili.*





*Banksia integrifolia*



*Spirea Pululala.*



*Lobelia cardinalis.*



*Paeonia officinalis*



*Brickellia Mannifera*



*Lonicera periclymenum*



*Storaxylon Americanum*



*Myrica aspera*





*Lathyrus pratensis.*



*Purshia Coulteriana.*



*Lythrum Salicaria.*



*Sarcocolla leucantha.*



*Solanum Prickly*



*Lupinus & Mutablis.*



*Dalea Purshii*



*Protea repens.*





*Scilla Lutea*



*Pinus fulgens*

Descripta per Linnaeum

Pinus fulgens

Pinus fulgens



*Verbena fruticulosa*



*Begonia Borinquensis*



*Digitalis purpurea*